

Exploitation : SCEA de KERZEVEN  
Parcelle : Grand Kergezequel  
Type de sol : limon argileux

Commentaires :

  

## Adventices étudiées :

| Adventices :    | Risque : |  |
|-----------------|----------|--|
| Renouée liseron | 78       |  |
| Matricaire      | 69       |  |
| Ray-grass       | 7        |  |

## Système de culture

### Situation initiale :

#### Année 1 - Maïs

|  |   |  |  |   |
|--|---|--|--|---|
| <b>Date de semis</b><br>Avr-d3<br>Renouée liseron : 137<br>Matricaire : 42<br>Ray-grass : 12 | <b>Étouffement culture</b><br>Association de cultures : Aucune<br>Très faible<br>Renouée liseron : 0<br>Matricaire : 0<br>Ray-grass : 0 | <b>Interculture</b><br>Date des faux semis : Aoû-d1<br>Date de semis du couvert : Aoû-d3<br>Date de destruction : Mar-d3<br>Renouée liseron : 0<br>Matricaire : -1<br>Ray-grass : -2 | <b>Date de labour</b><br>Avr-d1<br>Renouée liseron : -2<br>Matricaire : -1<br>Ray-grass : -2 | <b>Densité de semis</b><br>10 gr/m²<br>Renouée liseron : 0<br>Matricaire : 0<br>Ray-grass : 0 |
| <b>Entre rangs</b><br>50 cm<br>Renouée liseron : -2<br>Matricaire : -2<br>Ray-grass : -2     | <b>Variété</b><br>Moyennement couvrante<br>Renouée liseron : -1<br>Matricaire : -1<br>Ray-grass : -1                                    | <b>Désherbage mécanique</b><br>Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :<br>Renouée liseron : 0<br>Matricaire : 0<br>Ray-grass : 0   | <b>Désherbage chimique</b><br>Mai-d1   | <b>Score annuel</b><br>Renouée liseron : 132<br>Matricaire : 37<br>Ray-grass : 5              |

## Année 2 - Maïs

| Date de semis   | Étouffement culture   | Interculture   | Date de labour  | Densité de semis  |
|---|---|--|---|---|
| <b>Avr-d3</b><br>Renouée liseron<br>137<br>Matricaire<br>42<br>Ray-grass<br>12              | Association de cultures :<br>Aucune<br>Très faible<br>Renouée liseron<br>0<br>Matricaire<br>0<br>Ray-grass<br>0 | Date des faux semis :<br>Non définie<br>Date de semis du couvert :<br>Non définie<br>Date de destruction :<br>Non définie<br>Renouée liseron<br>0<br>Matricaire<br>0<br>Ray-grass<br>0 | <b>Avr-d1</b><br>Renouée liseron<br>-2<br>Matricaire<br>-1<br>Ray-grass<br>-2 | 10 gr/m²<br>Renouée liseron<br>0<br>Matricaire<br>0<br>Ray-grass<br>0               |
| <b>Entre rangs</b><br>50 cm<br>Renouée liseron<br>-2<br>Matricaire<br>-2<br>Ray-grass<br>-2 | <b>Variété</b><br>Moyennement couvrante<br>Renouée liseron<br>-1<br>Matricaire<br>-1<br>Ray-grass<br>-1         | <b>Désherbage mécanique</b><br>Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :<br>Renouée liseron<br>0<br>Matricaire<br>0<br>Ray-grass<br>0  | <b>Désherbage chimique</b><br><b>Mai-d1</b>                                   | <b>Score annuel</b><br>Renouée liseron<br>132<br>Matricaire<br>38<br>Ray-grass<br>7 |

## Année 3 - Blé d'hiver

| Date de semis   | Étouffement culture   | Interculture   | Date de labour  | Densité de semis  |
|---|---|--|---|---|
| <b>Nov-d1</b><br>Renouée liseron<br>1<br>Matricaire<br>23<br>Ray-grass<br>18                  | Association de cultures :<br>Aucune<br>Faible<br>Renouée liseron<br>-4<br>Matricaire<br>-4<br>Ray-grass<br>-4 | Date des faux semis :<br>Non définie<br>Date de semis du couvert :<br>Non définie<br>Date de destruction :<br>Non définie<br>Renouée liseron<br>0<br>Matricaire<br>0<br>Ray-grass<br>0 | <b>Nov-d1</b><br>Renouée liseron<br>-2<br>Matricaire<br>-1<br>Ray-grass<br>-2 | 400 gr/m²<br>Renouée liseron<br>-2<br>Matricaire<br>-2<br>Ray-grass<br>-2         |
| <b>Entre rangs</b><br>12.5 cm<br>Renouée liseron<br>-2<br>Matricaire<br>-2<br>Ray-grass<br>-2 | <b>Variété</b><br>Moyennement couvrante<br>Renouée liseron<br>-1<br>Matricaire<br>-1<br>Ray-grass<br>-1       | <b>Désherbage mécanique</b><br>Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :<br>Renouée liseron<br>0<br>Matricaire<br>0<br>Ray-grass<br>0  | <b>Désherbage chimique</b><br><b>Mar-d1</b> <b>Nov-d1</b>                     | <b>Score annuel</b><br>Renouée liseron<br>0<br>Matricaire<br>14<br>Ray-grass<br>7 |

Année 4 - Pomme de terre

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| <div>Date de semis</div> <div>Avr-d3</div> <div>Renouée liseron133</div> <div>Matricaire38</div> <div>Ray-grass12</div> | <div>Étouffement culture</div> <div>Association de cultures :<br/>Aucune<br/>Très faible</div> <div>Renouée liseron0</div> <div>Matricaire0</div> <div>Ray-grass0</div> | <div>Interculture</div> <div>Date des faux semis :<br/>Aoû-d1</div> <div>Date de semis du couvert :<br/>Aoû-d3</div> <div>Date de destruction :<br/>Mar-d3</div> <div>Renouée liseron0</div> <div>Matricaire-1</div> <div>Ray-grass-2</div> | <div>Date de labour</div> <div>Avr-d1</div> <div>Renouée liseron-2</div> <div>Matricaire-1</div> <div>Ray-grass-2</div> | <div>Densité de semis</div> <div>7 gr/m²</div> <div>Renouée liseron0</div> <div>Matricaire0</div> <div>Ray-grass0</div> |
| <div>Entre rangs</div> <div>80 cm</div> <div>Renouée liseron0</div> <div>Matricaire0</div> <div>Ray-grass0</div>        | <div>Variété</div> <div>Moyennement couvrante</div> <div>Renouée liseron-1</div> <div>Matricaire-1</div> <div>Ray-grass-1</div>   | <div>Désherbage mécanique</div> <div>Bineuse :<br/>Houe rotative :<br/>Herse étrille :</div> <div>Renouée liseron0</div> <div>Matricaire0</div> <div>Ray-grass0</div>   | <div>Désherbage chimique</div> <div>Avr-d3</div>  | <div>Score annuel</div> <div>Renouée liseron129</div> <div>Matricaire35</div> <div>Ray-grass7</div>                     |