





Exploitation : Ferme des Sablières  
Parcelle : BARREAU  
Type de sol : Limono-argileux

Commentaires :


## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Chénopode	62	
Renouée liseron	69	
Panic pied-de-coq	22	
Morelle	27	

## Système de culture

Situation initiale :

## Année 1 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Avr-d3</p> <p>Chénopode 62</p> <p>Renouée liseron 137</p> <p>Panic pied-de-coq 52</p> <p>Morelle 52</p>	<p>Association de cultures : Aucune</p> <p>Très faible</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Morelle 0</p>	<p>Date des faux semis : Aoû-d3 Jul-d3</p> <p>Date de semis du couvert : Sep-d2</p> <p>Date de destruction : Déc-d2</p> <p>Chénopode -3</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Panic pied-de-coq -7</p> <p>Morelle -7</p>	<p>Fév-d2</p> <p>Chénopode -1</p> <p>Renouée liseron -2</p> <p>Panic pied-de-coq -1</p> <p>Morelle -1</p>	<p>10 gr/m²</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Morelle 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>75 cm</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Morelle 0</p>	<p>Très couvrante</p> <p>Chénopode -2</p> <p>Renouée liseron -2</p> <p>Panic pied-de-coq -2</p> <p>Morelle -2</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Morelle 0</p>	<p>Mai-d2</p>	<p>Chénopode 56</p> <p>Renouée liseron 134</p> <p>Panic pied-de-coq 42</p> <p>Morelle 43</p>

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Oct-d2</p> <p>Chénopode 11</p> <p>Renouée liseron 1</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Morelle 0</p>	<p>Association de cultures : Aucune</p> <p>Faible</p> <p>Chénopode -4</p> <p>Renouée liseron -4</p> <p>Panic pied-de-coq -4</p> <p>Morelle -4</p>	<p>Date des faux semis : Non définie</p> <p>Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Morelle 0</p>	<p>Oct-d2</p> <p>Chénopode -1</p> <p>Renouée liseron -2</p> <p>Panic pied-de-coq -1</p> <p>Morelle -1</p>	<p>220 gr/m²</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Morelle 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>15 cm</p> <p>Chénopode -1</p> <p>Renouée liseron -1</p> <p>Panic pied-de-coq -1</p> <p>Morelle -1</p>	<p>Moyennement couvrante</p> <p>Chénopode -1</p> <p>Renouée liseron -1</p> <p>Panic pied-de-coq -1</p> <p>Morelle -1</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Morelle 0</p>	<p>Oct-d2</p>	<p>Chénopode 4</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Morelle 0</p>

Année 3 - Pomme de terre

Date de semis	
Avr-d3	
Chénopode	57
Renouée liseron	133
Panic pied-de-coq	35
Morelle	35

Étouffement culture	
Association de cultures : Aucune Très faible	
Chénopode	0
Renouée liseron	0
Panic pied-de-coq	0
Morelle	0

Interculture	
Date des faux semis : Sep-d1    Aoû-d2	
Date de semis du couvert : Sep-d2	
Date de destruction : Avr-d3	
Chénopode	-3
Renouée liseron	0
Panic pied-de-coq	-5
Morelle	-5

Date de labour	
Avr-d3	
Chénopode	-1
Renouée liseron	-3
Panic pied-de-coq	-1
Morelle	-1

Densité de semis	
3.5 gr/m²	
Chénopode	0
Renouée liseron	0
Panic pied-de-coq	0
Morelle	0

Entre rangs	
75 cm	
Chénopode	0
Renouée liseron	0
Panic pied-de-coq	0
Morelle	0

Variété	
Très couvrante	
Chénopode	-2
Renouée liseron	-2
Panic pied-de-coq	-2
Morelle	-2

Désherbage mécanique	
Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	
Chénopode	0
Renouée liseron	0
Panic pied-de-coq	0
Morelle	0

Désherbage chimique	
Mai-d1	

Score annuel	
Chénopode	50
Renouée liseron	128
Panic pied-de-coq	27
Morelle	28