

Exploitation :  
Parcelle :  
Type de sol :

GAEC du Limon  
Koeppel  
Limon argilo-sableux

Commentaires :

  

## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Chénopode	39	
Vulpin	21	
Renouée liseron	27	

## Système de culture

### Situation initiale :

#### Année 1 - Blé d'hiver

<p>Date de semis</p> <p>Oct-d3</p> <p>Chénopode 8</p> <p>Vulpin 35</p> <p>Renouée liseron 1</p>	<p>Étouffement culture</p> <p>Association de cultures : Aucune Faible</p> <p>Chénopode -4</p> <p>Vulpin -4</p> <p>Renouée liseron -4</p>	<p>Interculture</p> <p>Date des faux semis : Oct-d1</p> <p>Date de semis du couvert : Aoû-d3</p> <p>Date de destruction : Avr-d2</p> <p>Chénopode -1</p> <p>Vulpin -6</p> <p>Renouée liseron 0</p>	<p>Date de labour</p> <p>Oct-d1</p> <p>Chénopode -3</p> <p>Vulpin -17</p> <p>Renouée liseron -6</p>	<p>Densité de semis</p> <p>285 gr/m²</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Renouée liseron 0</p>
<p>Entre rangs</p> <p>12.5 cm</p> <p>Chénopode -2</p> <p>Vulpin -2</p> <p>Renouée liseron -2</p>	<p>Variété</p> <p>Non couvrante</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Renouée liseron 0</p>	<p>Désherbage mécanique</p> <p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Renouée liseron 0</p>	<p>Désherbage chimique</p> <p>Nov-d3 Oct-d3</p>	<p>Score annuel</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Vulpin 6</p> <p>Renouée liseron 0</p>

## Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Avr-d3	105 gr/m²
Chénopode 62	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -5	Chénopode 0
Vulpin 15	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -10	Vulpin 0
Renouée liseron 137	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -11	Renouée liseron 0

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
75 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d1 Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d3	
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -2		Chénopode 56
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 4
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -5		Renouée liseron 121

## Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d2	280 gr/m²
Chénopode 5	Chénopode -10	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode 0
Vulpin 56	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin -16	Vulpin 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -10	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2 Oct-d2	
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 0
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 27
Renouée liseron -2	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0

Année 4 - Colza d'hiver

Date de semis

Août-d3

Chénopode 31

Vulpin 89

Renouée liseron  
0

Étouffement culture

Association de cultures :  
Aucune  
Moyen

Chénopode -6

Vulpin -6

Renouée liseron -6

Interculture

Date des faux semis :  
Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Chénopode 0

Vulpin 0

Renouée liseron  
0

Date de labour

Pas de labour

Chénopode 0

Vulpin 0

Renouée liseron 0

Densité de semis

40 gr/m<sup>2</sup>

Chénopode 0

Vulpin 0

Renouée liseron  
0

Entre rangs

12.5 cm

Chénopode -2

Vulpin -2

Renouée liseron  
-2

Variété

Non couvrante

Chénopode 0

Vulpin 0

Renouée liseron 0

Désherbage mécanique

Bineuse :  
Houe rotative :  
Herse étrille :

Chénopode 0

Vulpin 0

Renouée liseron  
0

Désherbage chimique

Nov-d2

Sep-d3

Août-d3

Score annuel

Chénopode 23

Vulpin 81

Renouée liseron  
0