

Exploitation : Philippe
 Parcelle : L'Eglise
 Type de sol : calcaires de Néhou

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	27
Vulpin	35
Ray-grass	32

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver				
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1 Chénopode 15 Vulpin 87 Ray-grass 69	Association de cultures : Aucune Faible Chénopode -4 Vulpin -4 Ray-grass -4	Date des faux semis : Non définie Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode 0 Vulpin 0 Ray-grass 0	Oct-d1 Chénopode -1 Vulpin -4 Ray-grass -3	300 gr/m ² Chénopode 0 Vulpin 0 Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
14 cm Chénopode -1 Vulpin -1 Ray-grass -1	Non couvrante Chénopode 0 Vulpin 0 Ray-grass 0	Bineuse : Fév-d2 Houe rotative : Non définie Herse étrille : Non définie Chénopode -1 Vulpin -1 Ray-grass -0	Mar-d2 Jan-d2 Chénopode -1 Vulpin -1 Ray-grass -0	Chénopode 8 Vulpin 76 Ray-grass 60

Année 2 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Non définie Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Jan-d2	250 gr/m ²
Chénopode 37	Chénopode -10	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0
Vulpin 24	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin 0
Ray-grass 21	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2 Fév-d2	Chénopode 24 Vulpin 10 Ray-grass 7
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		