

Exploitation : Philippe
 Parcelle : L'Eglise
 Type de sol : calcaires de Néhou

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	21
Vulpin	28
Ray-grass	24

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver					
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
Oct-d1 Chénopode 15 Vulpin 87 Ray-grass 69	Association de cultures : Aucune Faible Chénopode -4 Vulpin -4 Ray-grass -4	Date des faux semis : Sep-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode -2 Vulpin -4 Ray-grass -5	Oct-d1 Chénopode -1 Vulpin -4 Ray-grass -3	400 gr/m ² Chénopode -2 Vulpin -2 Ray-grass -2	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
12 cm Chénopode -2 Vulpin -2 Ray-grass -2	Très couvrante Chénopode -2 Vulpin -2 Ray-grass -2	Bineuse : Mai-d2 Houe rotative : Nov-d1 Oct-d1 Herse étrille : Chénopode -1 Vulpin -8 Ray-grass -6	Oct-d1 Fév-d2 Mar-d2 Chénopode 2 Vulpin 61 Ray-grass 45		

Année 2 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Déc-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Jan-d2	350 gr/m ²
Chénopode 37	Chénopode -10	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0
Vulpin 24	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin 0
Ray-grass 21	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herve étrille : Fév-d2 Jan-d2	Déc-d1 Fév-d2 Mar-d2	Chénopode 23 Vulpin 8 Ray-grass 6
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode -1		
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin -1		
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass -0		