

Exploitation :

GAEC Chèvrerie-La-Truière

Parcelle :

SEA - ÉTÉ

Type de sol :

Argilo-Limoneux

Commentaires :


  


Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	25
Vulpin	19
Matricaire	24

## Système de culture

Situation initiale :



## Année 2 - Triticale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3 Ray-grass 31 Vulpin 31 Mataïcaire 20	Association de cultures : Aucune Moyen Ray-grass -6 Vulpin -6 Mataïcaire -6	Date des faux semis : Aoû-d3 Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass -6 Vulpin -3 Mataïcaire -3	Oct-d1 Ray-grass -9 Vulpin -13 Mataïcaire -2	250 gr/m <sup>2</sup> Ray-grass 0 Vulpin 0 Mataïcaire 0
Entre rangs 12 cm Ray-grass -2 Vulpin -2 Mataïcaire -2	Variété Très couvrante Ray-grass -2 Vulpin -2 Mataïcaire -2	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mai-d1 Ray-grass 0 Vulpin 0 Mataïcaire 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 6 Vulpin 6 Mataïcaire 5

## Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1 Ray-grass 18 Vulpin 14 Mataïcaire 23	Association de cultures : Autre culture d'hiver Faible Ray-grass -4 Vulpin -4 Mataïcaire -4	Date des faux semis : Aoû-d3 Aoû-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass -7 Vulpin -4 Mataïcaire -3	Oct-d2 Ray-grass -8 Vulpin -12 Mataïcaire -2	350 gr/m <sup>2</sup> Ray-grass 0 Vulpin 0 Mataïcaire 0
Entre rangs 12 cm Ray-grass -2 Vulpin -2 Mataïcaire -2	Variété Moyennement couvrante Ray-grass -1 Vulpin -1 Mataïcaire -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mai-d1 Avr-d3 Ray-grass 0 Vulpin 0 Mataïcaire 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 0 Vulpin 0 Mataïcaire 11