

Exploitation :

GAEC Beun

Parcelle :

beunparcelle

Type de sol :

Limon

Commentaires :

  


Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	25
Chénopode	46
Vulpin	28

## Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Maïs					
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
Avr-d1 Ray-grass 27 Chénopode 71 Vulpin 28	Association de cultures : Aucune Moyen Ray-grass -6 Chénopode -6 Vulpin -6	Date des faux semis : Jan-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Mar-d1 Ray-grass 0 Chénopode 0 Vulpin 0	Mar-d1 Ray-grass -2 Chénopode -1 Vulpin -3	5 gr/m <sup>2</sup> Ray-grass 0 Chénopode 0 Vulpin 0	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
75 cm Ray-grass 0 Chénopode 0 Vulpin 0	Très couvrante Ray-grass -2 Chénopode -2 Vulpin -2	Bineuse : Avr-d1 Houe rotative : Avr-d1 Herse étrille : Avr-d1 Ray-grass -6 Chénopode -10 Vulpin -6	Mar-d1 Aoû-d1 Jun-d1 Ray-grass -6 Chénopode -10 Vulpin -6	Ray-grass 11 Chénopode 52 Vulpin 12	

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1 Ray-grass 69 Chénopode 15 Vulpin 87	Association de cultures : Aucune Fort Ray-grass -10 Chénopode -10 Vulpin -10	Date des faux semis : Sep-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Oct-d1 Ray-grass -5 Chénopode -2 Vulpin -4	Oct-d1 Ray-grass -3 Chénopode -1 Vulpin -4	450 gr/m <sup>2</sup> Ray-grass -2 Chénopode -2 Vulpin -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm Ray-grass -2 Chénopode -2 Vulpin -2	Très couvrante Ray-grass -2 Chénopode -2 Vulpin -2	Bineuse : Oct-d1 Houe rotative : Jan-d2 Herse étrille : Ray-grass -4 Chénopode -1 Vulpin -7	Oct-d1 Déc-d1 Mar-d2 Ray-grass 41 Chénopode 0 Vulpin 56	