

Exploitation :

SCEA Cépy

Parcelle :

Vallée au renard

Type de sol :

Limoneux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	13
Chénopode	29
Ray-grass	10

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver				
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div> Nov-d1 Vulpin 14 Chénopode 6 Ray-grass 18 </div>	Association de cultures : Aucune Faible <div> Vulpin -4 Chénopode -4 Ray-grass -4 </div>	Date des faux semis : <div> Sep-d3 Aoû-d1 </div> Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div> Vulpin -6 Chénopode -3 Ray-grass -7 </div>	<div> Oct-d2 Vulpin -8 Chénopode -1 Ray-grass -6 </div>	300 gr/m ² <div> Vulpin 0 Chénopode 0 Ray-grass 0 </div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm <div> Vulpin -1 Chénopode -1 Ray-grass -1 </div>	Moyennement couvrante <div> Vulpin -1 Chénopode -1 Ray-grass -1 </div>	Bineuse : Houe rotative : <div> Nov-d3 Mar-d1 </div> Herse étrille : <div> Vulpin -1 Chénopode -2 Ray-grass -1 </div>		<div> Vulpin 0 Chénopode 0 Ray-grass 0 </div>

Année 2 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Sep-d2 Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d1	400 gr/m ²
Vulpin 83	Vulpin -10 Chénopode -10 Ray-grass -10	Vulpin -5 Chénopode -3 Ray-grass -7	Vulpin -9 Chénopode -1 Ray-grass -6	Vulpin -2 Chénopode -2 Ray-grass -2
15 cm	Moyennement couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Vulpin -1 Chénopode -1 Ray-grass -1	Vulpin -1 Chénopode -1 Ray-grass -1	Bineuse : Houe rotative : Oct-d3 Fév-d3 Herse étrille : Vulpin -4 Chénopode -0 Ray-grass -3		Vulpin 52 Chénopode 0 Ray-grass 36
Entre rangs	Variété			
45 cm	Très couvrante			
Vulpin 0 Chénopode 0 Ray-grass 0	Vulpin -2 Chénopode -2 Ray-grass -2			

Année 3 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Sep-d1 Aoû-d1 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Nov-d3	Nov-d3	14 gr/m ²
Vulpin 15 Chénopode 57 Ray-grass 12	Vulpin 0 Chénopode 0 Ray-grass 0	Vulpin -4 Chénopode -3 Ray-grass -7	Vulpin -4 Chénopode -1 Ray-grass -3	Vulpin 0 Chénopode 0 Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Très couvrante	Bineuse : Jul-d1 Jun-d2 Mai-d3 Mai-d1 Houe rotative : Herse étrille : Vulpin -1 Chénopode -7 Ray-grass -1		Vulpin 4 Chénopode 43 Ray-grass 0
Vulpin 0 Chénopode 0 Ray-grass 0	Vulpin -2 Chénopode -2 Ray-grass -2			