




Exploitation : GAEC Lorne
Parcelle : Cul d'oie
Type de sol : Planosol limoneux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	0 
Stellaire intermédiaire	36 
Paturin	65 

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Maïs

Date de semis Mai-d3 Vulpin 1 Stellaire intermédiaire 24 Paturin 50	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Vulpin 0 Stellaire intermédiaire 0 Paturin 0	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Jan-d1 Vulpin 0 Stellaire intermédiaire 0 Paturin 0	Date de labour Jan-d1 Vulpin -2 Stellaire intermédiaire -1 Paturin -1	Densité de semis 9.5 gr/m² Vulpin 0 Stellaire intermédiaire 0 Paturin 0
Entre rangs 80 cm Vulpin 0 Stellaire intermédiaire 0 Paturin 0	Variété Non couvrante Vulpin 0 Stellaire intermédiaire 0 Paturin 0	Désherbage mécanique Bineuse : Jul-d2 Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Stellaire intermédiaire 0 Paturin 0	Désherbage chimique Jun-d3 Jun-d2 Mai-d2	Score annuel Vulpin 0 Stellaire intermédiaire 23 Paturin 50

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Nov-d2	270 gr/m²
Vulpin 4	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin 0
Stellaire intermédiaire 19	Stellaire intermédiaire -4	Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire -1	Stellaire intermédiaire 0
Paturin 13	Paturin -4	Paturin 0	Paturin -1	Paturin 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3 Nov-d2	
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0
Stellaire intermédiaire -1	Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire 0		Stellaire intermédiaire 13
Paturin -1	Paturin 0	Paturin 0		Paturin 8