





Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

GAEC des Ruettes
12
limon argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Véronique de perse	69	
Morelle	29	
Renouée liseron	67	
Ray-grass	8	

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Maïs

Date de semis <div>Avr-d3</div> <div>Véronique de perse</div> <div>50</div> <div>Morelle</div> <div>52</div> <div>Renouée liseron</div> <div>137</div> <div>Ray-grass</div> <div>12</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible <div>Véronique de perse</div> <div>0</div> <div>Morelle</div> <div>0</div> <div>Renouée liseron</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div>	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Oct-d2</div> Date de destruction : <div>Avr-d3</div> <div>Véronique de perse</div> <div>0</div> <div>Morelle</div> <div>0</div> <div>Renouée liseron</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div>	Date de labour <div>Avr-d2</div> <div>Véronique de perse</div> <div>-1</div> <div>Morelle</div> <div>-1</div> <div>Renouée liseron</div> <div>-3</div> <div>Ray-grass</div> <div>-2</div>	Densité de semis 10 gr/m ² <div>Véronique de perse</div> <div>0</div> <div>Morelle</div> <div>0</div> <div>Renouée liseron</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div>
Entre rangs 75 cm <div>Véronique de perse</div> <div>0</div> <div>Morelle</div> <div>0</div> <div>Renouée liseron</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div>	Variété Moyennement couvrante <div>Véronique de perse</div> <div>-1</div> <div>Morelle</div> <div>-1</div> <div>Renouée liseron</div> <div>-1</div> <div>Ray-grass</div> <div>-1</div>	Désherbage mécanique Bineuse : <div>Jun-d1</div> Houe rotative : Herse étrille : <div>Véronique de perse</div> <div>-2</div> <div>Morelle</div> <div>-5</div> <div>Renouée liseron</div> <div>-5</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div>	Désherbage chimique <div>Jun-d1</div>	Score annuel <div>Véronique de perse</div> <div>46</div> <div>Morelle</div> <div>45</div> <div>Renouée liseron</div> <div>129</div> <div>Ray-grass</div> <div>9</div>

Année 2 - Orge d'hiver

Date de semis <div>Nov-d2</div> <div>Véronique de perse</div> <div>20</div> <div>Morelle</div> <div>0</div> <div>Renouée liseron</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>4</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Fort <div>Véronique de perse</div> <div>-10</div> <div>Morelle</div> <div>-10</div> <div>Renouée liseron</div> <div>-10</div> <div>Ray-grass</div> <div>-10</div>	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Véronique de perse</div> <div>0</div> <div>Morelle</div> <div>0</div> <div>Renouée liseron</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div>	Date de labour <div>Nov-d1</div> <div>Véronique de perse</div> <div>-1</div> <div>Morelle</div> <div>-1</div> <div>Renouée liseron</div> <div>-2</div> <div>Ray-grass</div> <div>-2</div>	Densité de semis 180 gr/m ² <div>Véronique de perse</div> <div>0</div> <div>Morelle</div> <div>0</div> <div>Renouée liseron</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div>
Entre rangs 12.5 cm <div>Véronique de perse</div> <div>-2</div> <div>Morelle</div> <div>-2</div> <div>Renouée liseron</div> <div>-2</div> <div>Ray-grass</div> <div>-2</div>	Variété Très couvrante <div>Véronique de perse</div> <div>-2</div> <div>Morelle</div> <div>-2</div> <div>Renouée liseron</div> <div>-2</div> <div>Ray-grass</div> <div>-2</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : <div>Non définie</div> Herse étrille : <div>Véronique de perse</div> <div>0</div> <div>Morelle</div> <div>0</div> <div>Renouée liseron</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div>	Désherbage chimique <div>Nov-d3</div>	Score annuel <div>Véronique de perse</div> <div>5</div> <div>Morelle</div> <div>0</div> <div>Renouée liseron</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div>

Année 3 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Avr-d2</div> <div>Véronique de perse 49</div> <div>Morelle 36</div> <div>Renouée liseron 134</div> <div>Ray-grass 19</div>	<div>Association de cultures : Aucune Très faible</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	<div>Date des faux semis : Date de semis du couvert : Jul-d3</div> <div>Date de destruction : Avr-d1</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	<div>Avr-d1</div> <div>Véronique de perse -1</div> <div>Morelle -1</div> <div>Renouée liseron -2</div> <div>Ray-grass -2</div>	<div>10 gr/m²</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Ray-grass 0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<div>75 cm</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	<div>Moyennement couvrante</div> <div>Véronique de perse -1</div> <div>Morelle -1</div> <div>Renouée liseron -1</div> <div>Ray-grass -1</div>	<div>Bineuse : Mai-d2</div> <div>Houe rotative :</div> <div>Herse étrille :</div> <div>Véronique de perse -2</div> <div>Morelle -2</div> <div>Renouée liseron -7</div> <div>Ray-grass -0</div>	<div>Jun-d2</div>	<div>Véronique de perse 45</div> <div>Morelle 33</div> <div>Renouée liseron 124</div> <div>Ray-grass 16</div>