

Exploitation :

GAEC Patoux

Parcelle :

la mère aïzol

Type de sol :

limon argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	21
Ray-grass	24
Chénopode	45

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Orge d'hiver				
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Sep-d3	350 gr/m ²
Vulpin 83 Ray-grass 66 Chénopode 9	Vulpin -10 Ray-grass -10 Chénopode -10	Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0	Vulpin -16 Ray-grass -12 Chénopode -3	Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0	Oct-d2	Vulpin 55 Ray-grass 41 Chénopode 0
Vulpin -1 Ray-grass -1 Chénopode -1	Vulpin -1 Ray-grass -1 Chénopode -1			

Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Jul-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	38 gr/m ²
Vulpin 89	Vulpin -6 Ray-grass -6 Chénopode -6	Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode -2	Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0
Ray-grass 96				
Chénopode 31				
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
40 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herve étrille :		Vulpin 82 Ray-grass 89 Chénopode 22
Vulpin 0	Vulpin -1 Ray-grass -1 Chénopode -1	Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0		
Ray-grass 0				
Chénopode 0				

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Aoû-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	350 gr/m ²
Vulpin 104	Vulpin -4 Ray-grass -4 Chénopode -4	Vulpin -3 Ray-grass -4 Chénopode -2	Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0
Ray-grass 84				
Chénopode 21				
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herve étrille :	Oct-d2	Vulpin 95 Ray-grass 74 Chénopode 13
Vulpin -1	Vulpin -1 Ray-grass -1 Chénopode -1	Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0		
Ray-grass -1				
Chénopode -1				

Année 4 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Nov-d1	Fév-d2	12 gr/m ²
Vulpin 9 Ray-grass 6 Chénopode 57	Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0	Vulpin -10 Ray-grass -7 Chénopode -3	Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
80 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0	Avr-d2	Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 53
Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0	Vulpin -1 Ray-grass -1 Chénopode -1			

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d3	350 gr/m ²
Vulpin 14 Ray-grass 18 Chénopode 6	Vulpin -4 Ray-grass -4 Chénopode -4	Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0	Vulpin -14 Ray-grass -10 Chénopode -3	Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0	Oct-d2	Vulpin 0 Ray-grass 2 Chénopode 0
Vulpin -1 Ray-grass -1 Chénopode -1	Vulpin -1 Ray-grass -1 Chénopode -1			

Année 6 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Nov-d1	Nov-d2	12 gr/m ²
Vulpin 21	Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0	Vulpin -10 Ray-grass -7 Chénopode -2	Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0
Ray-grass 19				
Chénopode 63				
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0	Avr-d1 Jul-d1 Aoû-d2	Vulpin 10 Ray-grass 10 Chénopode 58
Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0	Vulpin -2 Ray-grass -2 Chénopode -2			

Année 7 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Déc-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Déc-d2	400 gr/m ²
Vulpin 8 Ray-grass 4 Chénopode 7	Vulpin -4 Ray-grass -4 Chénopode -4	Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0	Vulpin -9 Ray-grass -6 Chénopode -2	Vulpin -2 Ray-grass -2 Chénopode -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0	Nov-d1 Nov-d3	Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0
Vulpin -1 Ray-grass -1 Chénopode -1	Vulpin -1 Ray-grass -1 Chénopode -1			