

Exploitation : EARL KOCH
Parcelle : Ferme
Type de sol : Limoneux-Argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	46	
Agrostis	21	
Folle-avoine	13	

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d2 Vulpin 60 Agrostis 36 Folle-avoine 26	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Vulpin -4 Agrostis -4 Folle-avoine -4	Interculture Date des faux semis : Sep-d2 Aoû-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin -8 Agrostis -0 Folle-avoine -3	Date de labour Pas de labour Vulpin 0 Agrostis 0 Folle-avoine 0	Densité de semis 280 gr/m² Vulpin 0 Agrostis 0 Folle-avoine 0
Entre rangs 15 cm Vulpin -1 Agrostis -1 Folle-avoine -1	Variété Non couvrante Vulpin 0 Agrostis 0 Folle-avoine 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Agrostis 0 Folle-avoine 0	Désherbage chimique Oct-d3 Oct-d2 Mai-d2	Score annuel Vulpin 47 Agrostis 30 Folle-avoine 19

Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis <div>Aoû-d2</div> <div>Vulpin 68</div> <div>Agrostis 5</div> <div>Folle-avoine 22</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible <div>Vulpin -4</div> <div>Agrostis -4</div> <div>Folle-avoine -4</div>	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Agrostis 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Agrostis 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	Densité de semis 40 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Agrostis 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>
Entre rangs 30 cm <div>Vulpin -2</div> <div>Agrostis -2</div> <div>Folle-avoine -2</div>	Variété Non couvrante <div>Vulpin 0</div> <div>Agrostis 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Agrostis 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	Désherbage chimique <div>Oct-d2</div> <div>Sep-d2</div>	Score annuel <div>Vulpin 62</div> <div>Agrostis 0</div> <div>Folle-avoine 16</div>

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis <div>Oct-d2</div> <div>Vulpin 56</div> <div>Agrostis 28</div> <div>Folle-avoine 13</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible <div>Vulpin -4</div> <div>Agrostis -4</div> <div>Folle-avoine -4</div>	Interculture Date des faux semis : <div>Sep-d3</div> <div>Aoû-d3</div> Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Vulpin -8</div> <div>Agrostis -1</div> <div>Folle-avoine -3</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Agrostis 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	Densité de semis 250 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Agrostis 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>
Entre rangs 15 cm <div>Vulpin -1</div> <div>Agrostis -1</div> <div>Folle-avoine -1</div>	Variété Non couvrante <div>Vulpin 0</div> <div>Agrostis 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Agrostis 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	Désherbage chimique <div>Oct-d2</div> <div>Mai-d3</div>	Score annuel <div>Vulpin 43</div> <div>Agrostis 23</div> <div>Folle-avoine 6</div>