

Exploitation :

GAEC du Pré des Poiriers

Parcelle :

Le Vieux Noyer

Type de sol :

ARGILO CALCAIRE MOYEN

Commentaires :


Culture : avoine

Adventices étudiées :



Système de culture

Situation initiale :



Année 2 - Avoine de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1 Folle-avoine 69 Ray-grass 27 Vulpin 28	Association de cultures : Aucune Moyen Folle-avoine -6 Ray-grass -6 Vulpin -6	Date des faux semis : Aoû-d3 Jun-d1 Date de semis du couvert : Aoû-d3 Date de destruction : Mar-d1 Folle-avoine -2 Ray-grass -4 Vulpin -3	Nov-d2 Folle-avoine -7 Ray-grass -7 Vulpin -10	350 gr/m ² Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
14 cm Folle-avoine -1 Ray-grass -1 Vulpin -1	Moyennement couvrante Folle-avoine -1 Ray-grass -1 Vulpin -1	Bineuse : Mai-d1 Avr-d1 Houe rotative : Mai-d2 Herse étrille : Avr-d2 Fév-d1 Folle-avoine -10 Ray-grass -4 Vulpin -4		Folle-avoine 42 Ray-grass 3 Vulpin 4