

Exploitation : GAEC de la Touvière  
Parcelle : Léonel  
Type de sol : argilo-calcaire

Commentaires :

  

## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Renouée liseron	0	
Chénopode	0	
Ray-grass	41	

## Système de culture

### Situation initiale :

#### Année 1 - Triticale

<b>Date de semis</b> Oct-d1 Renouée liseron : 0 Chénopode : 9 Ray-grass : 66	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Moyen Renouée liseron : -6 Chénopode : -6 Ray-grass : -6	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Aoû-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Renouée liseron : 0 Chénopode : -2 Ray-grass : -3	<b>Date de labour</b> Sep-d2 Renouée liseron : -6 Chénopode : -3 Ray-grass : -13	<b>Densité de semis</b> 60 gr/m² Renouée liseron : 0 Chénopode : 0 Ray-grass : 0
<b>Entre rangs</b> 5 cm Renouée liseron : -2 Chénopode : -2 Ray-grass : -2	<b>Variété</b> Moyennement couvrante Renouée liseron : -1 Chénopode : -1 Ray-grass : -1	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Renouée liseron : 0 Chénopode : 0 Ray-grass : 0	<b>Désherbage chimique</b> Nov-d3 Mar-d2	<b>Score annuel</b> Renouée liseron : 0 Chénopode : 0 Ray-grass : 41

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Aoû-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Sep-d1	230 gr/m²
Renouée liseron 1	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Chénopode 11	Chénopode -6	Chénopode -2	Chénopode -4	Chénopode 0
Ray-grass 52	Ray-grass -6	Ray-grass -3	Ray-grass -12	Ray-grass 0

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
8 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d1	
Renouée liseron -2	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 0
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 27

## Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Aoû-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Sep-d2	120 gr/m²
Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Chénopode 15	Chénopode -6	Chénopode -2	Chénopode -3	Chénopode 0
Ray-grass 80	Ray-grass -6	Ray-grass -3	Ray-grass -13	Ray-grass 0

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
8 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2    Mar-d1	
Renouée liseron -2	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 0
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 55