

Exploitation : SCEA DE FLEURY
 Parcelle : champ 1
 Type de sol : limon-argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	37
Vulpin	40
Renouée des oiseaux	60

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver				
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Oct-d1	Pas de labour	300 gr/m ²
Ray-grass 69 Vulpin 87 Renouée des oiseaux 9	Ray-grass -10 Vulpin -10 Renouée des oiseaux -10	Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d2	Jun-d2 Nov-d1	Ray-grass 56 Vulpin 74 Renouée des oiseaux 0
Ray-grass -1 Vulpin -1 Renouée des oiseaux -1	Ray-grass -2 Vulpin -2 Renouée des oiseaux -2	Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0		

Année 2 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3 Ray-grass 33 Vulpin 35 Renouée des oiseaux 128	Association de cultures : Aucune Très faible Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Mar-d3 Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0	Mar-d3 Ray-grass -9 Vulpin -12 Renouée des oiseaux -6	2000 gr/m ² Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0	Très couvrante Ray-grass -2 Vulpin -2 Renouée des oiseaux -2	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d2 Ray-grass -2 Vulpin -2 Renouée des oiseaux -7	Mai-d2 Mar-d2 Jun-d2 Ray-grass -2 Vulpin -2 Renouée des oiseaux -7	Ray-grass 21 Vulpin 20 Renouée des oiseaux 114