




Exploitation : EARL Vanholebeke
Parcelle : Trous d'obus
Type de sol : Argilo-limoneux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Matricaire	57	
Chénopode	42	
Mercuriale	38	

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

<p>Date de semis</p> <p>Oct-d2</p> <p>Matricaire 29</p> <p>Chénopode 11</p> <p>Mercuriale 26</p>	<p>Étouffement culture</p> <p>Association de cultures : Aucune</p> <p>Faible</p> <p>Matricaire -4</p> <p>Chénopode -4</p> <p>Mercuriale -4</p>	<p>Interculture</p> <p>Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Matricaire 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Mercuriale 0</p>	<p>Date de labour</p> <p>Août-d2</p> <p>Matricaire -1</p> <p>Chénopode -2</p> <p>Mercuriale -2</p>	<p>Densité de semis</p> <p>200 gr/m²</p> <p>Matricaire 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Mercuriale 0</p>
<p>Entre rangs</p> <p>12.5 cm</p> <p>Matricaire -2</p> <p>Chénopode -2</p> <p>Mercuriale -2</p>	<p>Variété</p> <p>Moyennement couvrante</p> <p>Matricaire -1</p> <p>Chénopode -1</p> <p>Mercuriale -1</p>	<p>Désherbage mécanique</p> <p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Matricaire 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Mercuriale 0</p>	<p>Désherbage chimique</p> <p>Mar-d2 Nov-d3</p>	<p>Score annuel</p> <p>Matricaire 21</p> <p>Chénopode 2</p> <p>Mercuriale 17</p>

Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d2	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Aoû-d1	60 gr/m²
Matricaire 30	Matricaire -6	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0
Chénopode 34	Chénopode -6	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0
Mercuriale 5	Mercuriale -6	Mercuriale 0	Mercuriale -2	Mercuriale 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
30 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Mar-d2 Houe rotative : Herse étrille :	Aoû-d3 Sep-d2	
Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire 0		Matricaire 20
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 23
Mercuriale -2	Mercuriale -1	Mercuriale 0		Mercuriale 0

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Aoû-d1	200 gr/m²
Matricaire 29	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0
Mercuriale 26	Mercuriale -4	Mercuriale 0	Mercuriale -2	Mercuriale 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2 Mar-d2 Nov-d3	
Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire 0		Matricaire 21
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 2
Mercuriale -2	Mercuriale -1	Mercuriale 0		Mercuriale 17

Année 4 - Betteraves

Date de semis

Avr-d2

Matricaire 42

Chénopode 63

Mercuriale 92

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Très faible

Matricaire 0

Chénopode 0

Mercuriale 0

Interculture

Date des faux semis :
Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Matricaire 0

Chénopode 0

Mercuriale 0

Date de labour

Aoû-d3

Matricaire -1

Chénopode -2

Mercuriale -2

Densité de semis

15 gr/m²

Matricaire 0

Chénopode 0

Mercuriale 0

Entre rangs

45 cm

Matricaire 0

Chénopode 0

Mercuriale 0

Variété

Non couvrante

Matricaire 0

Chénopode 0

Mercuriale 0

Désherbage mécanique

Bineuse :

Jun-d2

Houe rotative :

Herse étrille :

Matricaire -1

Chénopode -2

Mercuriale -4

Désherbage chimique

Avr-d1

Mai-d2

Jul-d2

Score annuel

Matricaire 39

Chénopode 59

Mercuriale 86