

Exploitation : scea Weexsteen
 Parcelle : bleu tour
 Type de sol : argilo-limoneux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	30
Vulpin	25
Folle-avoine	29

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Pomme de terre				
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Aoû-d2 Date de semis du couvert : Aoû-d3 Date de destruction : Oct-d1	Oct-d1	3.5 gr/m ²
Ray-grass 12 Vulpin 15 Folle-avoine 44	Ray-grass -4 Vulpin -4 Folle-avoine -4	Ray-grass -3 Vulpin -1 Folle-avoine -0	Ray-grass -6 Vulpin -9 Folle-avoine -5	Ray-grass 0 Vulpin 0 Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
75 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Non définie Houe rotative : Non définie Herse étrille : Non définie	Avr-d3	Ray-grass 0 Vulpin 0 Folle-avoine 34
Ray-grass 0 Vulpin 0 Folle-avoine 0	Ray-grass -1 Vulpin -1 Folle-avoine -1	Ray-grass 0 Vulpin 0 Folle-avoine 0		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Non définie Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d2	170 gr/m ²
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin -8	Vulpin 0
Folle-avoine 26	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
18 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Non définie Houe rotative : Non définie Herse étrille : Non définie	Nov-d3	Ray-grass 41 Vulpin 47 Folle-avoine 17
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0	
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0	
Folle-avoine 0	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	

Année 3 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	55 gr/m ²
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Folle-avoine 28	Folle-avoine -6	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Non définie Houe rotative : Non définie Herse étrille : Non définie	Aoû-d3	Ray-grass 87 Vulpin 82 Folle-avoine 21
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0	
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0	
Folle-avoine 0	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	

Année 4 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Aoû-d3 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Oct-d2	Oct-d2	85 gr/m ²
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin -3	Vulpin -8	Vulpin 0
Folle-avoine 56	Folle-avoine 0	Folle-avoine -1	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm	Non couvrante	Bineuse : Non définie Houe rotative : Non définie Herse étrille : Non définie	Mai-d2	Ray-grass 8 Vulpin 9 Folle-avoine 49
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		