


Exploitation : Non renseigné  
 Parcelle : 1  
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :


  


Adventices étudiées :



## Système de culture

Situation initiale :



## Année 2 - Blé de printemps

| Date de semis | Étouffement culture                          | Interculture   | Date de labour      | Densité de semis                         |
|---------------|--|--|---------------------|--|
| Oct-d2        | Association de cultures :<br>Aucune<br>Moyen | Date des faux semis :<br>Date de semis du couvert :<br>Non définie<br>Date de destruction :<br>Non définie | Sep-d2              | 420 gr/m <sup>2</sup>                    |
| Ray-grass 48  | Ray-grass -6                                 | Ray-grass 0  | Ray-grass -13       | Ray-grass -2                             |
| Chénopode 5   | Chénopode -6                                 | Chénopode 0  | Chénopode -3        | Chénopode -2                             |
| Vulpin 56     | Vulpin -6                                    | Vulpin 0   | Vulpin -16          | Vulpin -2                                |
|               |  |  |                     |  |
| Entre rangs   | Variété                                      | Désherbage mécanique   | Désherbage chimique | Score annuel                             |
| 12 cm         | Très couvrante                               | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Oct-d1<br>Herse étrille :<br>Oct-d2  |                     | Ray-grass 24<br>Chénopode 0<br>Vulpin 28 |
| Ray-grass -2  | Ray-grass -2                                 | Ray-grass 0  |                     |  |
| Chénopode -2  | Chénopode -2                                 | Chénopode 0  |                     |  |
| Vulpin -2     | Vulpin -2                                    | Vulpin 0   |                     |  |