

Exploitation : EARL GRANDE BOIXIERE
Parcelle : stage 1
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Folle-avoine	30	
Ray-grass	34	
Paturin	36	

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis Sep-d3 Folle-avoine 28 Ray-grass 80 Paturin 24	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen Folle-avoine -6 Ray-grass -6 Paturin -6	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Paturin 0	Date de labour Oct-d1 Folle-avoine -5 Ray-grass -6 Paturin -2	Densité de semis 50 gr/m² Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Paturin 0
Entre rangs 65 cm Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Paturin 0	Variété Non couvrante Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Paturin 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Oct-d2 Folle-avoine -1 Ray-grass -4 Paturin -1	Désherbage chimique Oct-d2	Score annuel Folle-avoine 16 Ray-grass 65 Paturin 15

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Oct-d3</div> <div>Folle-avoine 20</div> <div>Ray-grass 35</div> <div>Paturin 19</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible <div>Folle-avoine -4</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Paturin -4</div>	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Jul-d3</div> <div>Sep-d3</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Paturin 0</div>	Date de labour <div>Oct-d1</div> <div>Folle-avoine -5</div> <div>Ray-grass -6</div> <div>Paturin -2</div>	Densité de semis 250 gr/m² <div>Folle-avoine 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Paturin 0</div>
Entre rangs 20 cm <div>Folle-avoine 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Paturin 0</div>	Variété Non couvrante <div>Folle-avoine 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Paturin 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : <div>Nov-d2</div> Herse étrille : <div>Folle-avoine 0</div> <div>Ray-grass -1</div> <div>Paturin -1</div>	Désherbage chimique <div>Nov-d2</div>	Score annuel <div>Folle-avoine 11</div> <div>Ray-grass 24</div> <div>Paturin 12</div>

Année 3 - Orge de printemps

Date de semis <div>Mar-d1</div> <div>Folle-avoine 93</div> <div>Ray-grass 33</div> <div>Paturin 33</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Fort <div>Folle-avoine -10</div> <div>Ray-grass -10</div> <div>Paturin -10</div>	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Nov-d1</div> <div>Fév-d3</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Paturin 0</div>	Date de labour <div>Mar-d1</div> <div>Folle-avoine -7</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Paturin -2</div>	Densité de semis 200 gr/m² <div>Folle-avoine 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Paturin 0</div>
Entre rangs 35 cm <div>Folle-avoine 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Paturin 0</div>	Variété Non couvrante <div>Folle-avoine 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Paturin 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : <div>Avr-d2</div> Herse étrille : <div>Folle-avoine -4</div> <div>Ray-grass -2</div> <div>Paturin -2</div>	Désherbage chimique <div>Avr-d2</div>	Score annuel <div>Folle-avoine 73</div> <div>Ray-grass 18</div> <div>Paturin 20</div>