

Exploitation : Formation du 9/12  
 Parcelle : M. Durand  
 Type de sol : Argilo-calcaire

Commentaires :

  


## Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : |
|--------------|----------|
| Ray-grass    | 26       |
| Gaillet      | 23       |

## Système de culture

### Situation initiale :

| Année 1 - Colza d'hiver                          |  |  |   |   |  |
|--|--|--|---|---|--|
| Date de semis                                    | Étouffement culture  | Interculture   | Date de labour  | Densité de semis  |  |
| Aoû-d3<br><br>Ray-grass 96<br><br>Gaillet 25<br> | Association de cultures :<br>Aucune<br>Moyen<br><br>Ray-grass -6<br><br>Gaillet -6<br> | Date des faux semis :<br>Aoû-d1<br><br>Aoû-d2<br><br>Sep-d1<br><br><br>Date de semis du couvert :<br>Non définie<br><br><br>Date de destruction :<br>Non définie<br> | Pas de labour<br><br><br>Ray-grass 0<br><br>Gaillet 0<br> | 150 gr/m <sup>2</sup><br><br>Ray-grass 0<br><br>Gaillet 0<br> |  |
| Entre rangs                                      | Variété  | Désherbage mécanique   | Désherbage chimique                                       | Score annuel  |  |
| 15 cm  | Non couvrante  | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :<br><br>Ray-grass 0<br><br>Gaillet 0<br>  |   | Ray-grass 78<br><br>Gaillet 17<br>                            |  |
| Ray-grass -2<br><br>Gaillet -2<br>               | Ray-grass 0<br><br>Gaillet 0<br>   |  |   |   |  |

## Année 2 - Autre culture d'hiver

| Date de semis                                    | Étouffement culture   | Interculture   | Date de labour                       | Densité de semis                                  |
|--|---|--|--------------------------------------|---|
| Sep-d3<br>Ray-grass 80<br>Gaillet 81             | Association de cultures :<br>Aucune<br>Fort<br>Ray-grass -10<br>Gaillet -10 | Date des faux semis :<br>Sep-d1 Aoû-d2 Aoû-d1<br>Date de semis du couvert :<br>Non définie<br>Date de destruction :<br>Non définie<br>Ray-grass -10<br>Gaillet 0 | Jul-d3<br>Ray-grass -4<br>Gaillet -4 | 300 gr/m <sup>2</sup><br>Ray-grass 0<br>Gaillet 0 |
| Entre rangs<br>15 cm<br>Ray-grass 0<br>Gaillet 0 | Variété<br>Très couvrante<br>Ray-grass -2<br>Gaillet -2                     | Désherbage mécanique<br>Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :<br>Ray-grass 0<br>Gaillet 0  | Désherbage chimique                  | Score annuel<br>Ray-grass 55<br>Gaillet 65        |
|  |   |  |                                      |   |

## Année 3 - Maïs

| Date de semis                                    | Étouffement culture  | Interculture   | Date de labour                            | Densité de semis                                   |
|--|--|--|---|--|
| Jun-d2<br>Ray-grass 15<br>Gaillet 0              | Association de cultures :<br>Aucune<br>Très faible<br>Ray-grass 0<br>Gaillet 0 | Date des faux semis :<br>Sep-d1 Aoû-d3 Aoû-d1<br>Date de semis du couvert :<br>Non définie<br>Date de destruction :<br>Non définie<br>Ray-grass -11<br>Gaillet 0 | Pas de labour<br>Ray-grass 0<br>Gaillet 0 | 12.5 gr/m <sup>2</sup><br>Ray-grass 0<br>Gaillet 0 |
| Entre rangs<br>80 cm<br>Ray-grass 0<br>Gaillet 0 | Variété<br>Non couvrante<br>Ray-grass 0<br>Gaillet 0                           | Désherbage mécanique<br>Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :<br>Ray-grass 0<br>Gaillet 0  | Désherbage chimique                       | Score annuel<br>Ray-grass 4<br>Gaillet 0           |
|  |  |  |   |  |

#### Année 4 - Blé d'hiver

| Date de semis  | Étouffement culture   | Interculture  | Date de labour                       | Densité de semis                                  |
|--|---|---|--------------------------------------|---|
| Nov-d1<br>Ray-grass 18<br>Gaillet 84                 | Association de cultures :<br>Aucune<br>Faible<br>Ray-grass -4<br>Gaillet -4 | Date des faux semis :<br>Aoû-d2 Aoû-d1 Jul-d3<br>Date de semis du couvert :<br>Non définie<br>Date de destruction :<br>Non définie<br>Ray-grass -6<br>Gaillet 0 | Nov-d1<br>Ray-grass -4<br>Gaillet -8 | 310 gr/m <sup>2</sup><br>Ray-grass 0<br>Gaillet 0 |
| Entre rangs<br>12.5 cm<br>Ray-grass -2<br>Gaillet -2 | Variété<br>Non couvrante<br>Ray-grass 0<br>Gaillet 0                        | Désherbage mécanique<br>Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :<br>Ray-grass 0<br>Gaillet 0   | Désherbage chimique                  | Score annuel<br>Ray-grass 2<br>Gaillet 70         |
|  |   |   |                                      |   |

#### Année 5 - Autre culture d'hiver

| Date de semis                                    | Étouffement culture   | Interculture   | Date de labour                            | Densité de semis                                  |
|--|---|--|---|---|
| Sep-d1<br>Ray-grass 97<br>Gaillet 42             | Association de cultures :<br>Aucune<br>Fort<br>Ray-grass -10<br>Gaillet -10 | Date des faux semis :<br>Sep-d1 Aoû-d1 Aoû-d2<br>Date de semis du couvert :<br>Non définie<br>Date de destruction :<br>Non définie<br>Ray-grass -10<br>Gaillet 0 | Pas de labour<br>Ray-grass 0<br>Gaillet 0 | 300 gr/m <sup>2</sup><br>Ray-grass 0<br>Gaillet 0 |
| Entre rangs<br>15 cm<br>Ray-grass 0<br>Gaillet 0 | Variété<br>Très couvrante<br>Ray-grass -2<br>Gaillet -2                     | Désherbage mécanique<br>Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :<br>Ray-grass 0<br>Gaillet 0  | Désherbage chimique                       | Score annuel<br>Ray-grass 76<br>Gaillet 30        |
|  |   |  |   |   |

## Année 6 - Maïs

| Date de semis            | Étouffement culture                                | Interculture   | Date de labour                            | Densité de semis                                   |
|--------------------------|--|--|---|--|
| Mai-d2                   | Association de cultures :<br>Aucune<br>Très faible | Date des faux semis :<br>Aoû-d2 Aoû-d1 Sep-d1<br>Date de semis du couvert :<br>Non définie<br>Date de destruction :<br>Non définie | Pas de labour<br>Ray-grass 0<br>Gaillet 0 | 12.5 gr/m <sup>2</sup><br>Ray-grass 0<br>Gaillet 0 |
| Ray-grass 4<br>Gaillet 0 | Ray-grass 0<br>Gaillet 0                           | Ray-grass -10<br>Gaillet 0   |   |  |
| Entre rangs              | Variété  | Désherbage mécanique   | Désherbage chimique                       | Score annuel                                       |
| 80 cm                    | Non couvrante                                      | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :<br>Ray-grass 0<br>Gaillet 0  |   | Ray-grass 0<br>Gaillet 0                           |
| Ray-grass 0<br>Gaillet 0 | Ray-grass 0<br>Gaillet 0                           |  |   |  |

## Année 7 - Blé d'hiver

| Date de semis              | Étouffement culture                           | Interculture   | Date de labour                       | Densité de semis                                  |
|----------------------------|---|--|--------------------------------------|---|
| Nov-d1                     | Association de cultures :<br>Aucune<br>Faible | Date des faux semis :<br>Date de semis du couvert :<br>Non définie<br>Date de destruction :<br>Non définie | Oct-d3<br>Ray-grass -5<br>Gaillet -8 | 300 gr/m <sup>2</sup><br>Ray-grass 0<br>Gaillet 0 |
| Ray-grass 18<br>Gaillet 84 | Ray-grass -4<br>Gaillet -4                    | Ray-grass 0<br>Gaillet 0   |                                      |   |
| Entre rangs                | Variété                                       | Désherbage mécanique   | Désherbage chimique                  | Score annuel                                      |
| 15 cm                      | Non couvrante                                 | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :<br>Ray-grass 0<br>Gaillet 0                                |                                      | Ray-grass 8<br>Gaillet 71                         |
| Ray-grass -1<br>Gaillet -1 | Ray-grass 0<br>Gaillet 0                      |  |                                      |   |