

Exploitation : Non renseigné  
Parcelle : vignotte  
Type de sol : argileux

Commentaires :

  

## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Brome stérile	37	
Vulpin	43	
Matricaire	56	
Ray-grass	43	

## Système de culture

### Situation initiale :

#### Année 1 - Blé d'hiver

<p><b>Date de semis</b></p> <p>Oct-d1</p> <p>Brome stérile 93</p> <p>Vulpin 87</p> <p>Matricaire 32</p> <p>Ray-grass 69</p>	<p><b>Étouffement culture</b></p> <p>Association de cultures : Aucune</p> <p>Faible</p> <p>Brome stérile -4</p> <p>Vulpin -4</p> <p>Matricaire -4</p> <p>Ray-grass -4</p>	<p><b>Interculture</b></p> <p>Date des faux semis : Sep-d2</p> <p>Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Brome stérile -6</p> <p>Vulpin -5</p> <p>Matricaire -1</p> <p>Ray-grass -5</p>	<p><b>Date de labour</b></p> <p>Pas de labour</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Matricaire 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p><b>Densité de semis</b></p> <p>465 gr/m²</p> <p>Brome stérile -2</p> <p>Vulpin -2</p> <p>Matricaire -2</p> <p>Ray-grass -2</p>
<p><b>Entre rangs</b></p> <p>15 cm</p> <p>Brome stérile -1</p> <p>Vulpin -1</p> <p>Matricaire -1</p> <p>Ray-grass -1</p>	<p><b>Variété</b></p> <p>Moyennement couvrante</p> <p>Brome stérile -1</p> <p>Vulpin -1</p> <p>Matricaire -1</p> <p>Ray-grass -1</p>	<p><b>Désherbage mécanique</b></p> <p>Bineuse : Non définie</p> <p>Houe rotative :</p> <p>Herse étrille :</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Matricaire 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p><b>Désherbage chimique</b></p> <p>Nov-d2 Oct-d3 Mai-d2</p> <p>Fév-d3</p>	<p><b>Score annuel</b></p> <p>Brome stérile 80</p> <p>Vulpin 74</p> <p>Matricaire 23</p> <p>Ray-grass 56</p>

## Année 2 - Colza d'hiver

<b>Date de semis</b> <div>Sep-d1</div> <div>Brome stérile 115</div> <div>Vulpin 103</div> <div>Matricaire 30</div> <div>Ray-grass 97</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Moyen <div>Brome stérile -6</div> <div>Vulpin -6</div> <div>Matricaire -6</div> <div>Ray-grass -6</div>	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> <div>Non définie</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	<b>Date de labour</b> <div>Pas de labour</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	<b>Densité de semis</b> 37.5 gr/m² <div>Brome stérile 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Ray-grass 0</div>
<b>Entre rangs</b> 40 cm <div>Brome stérile 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	<b>Variété</b> Moyennement couvrante <div>Brome stérile -1</div> <div>Vulpin -1</div> <div>Matricaire -1</div> <div>Ray-grass -1</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Brome stérile 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	<b>Désherbage chimique</b> <div>Nov-d3</div> <div>Nov-d2</div> <div>Oct-d3</div>	<b>Score annuel</b> <div>Brome stérile 108</div> <div>Vulpin 96</div> <div>Matricaire 23</div> <div>Ray-grass 90</div>

## Année 3 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> <div>Oct-d2</div> <div>Brome stérile 71</div> <div>Vulpin 60</div> <div>Matricaire 29</div> <div>Ray-grass 52</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Faible <div>Brome stérile -4</div> <div>Vulpin -4</div> <div>Matricaire -4</div> <div>Ray-grass -4</div>	<b>Interculture</b> Date des faux semis : <div>Sep-d3</div> Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> <div>Non définie</div> <div>Brome stérile -6</div> <div>Vulpin -6</div> <div>Matricaire -1</div> <div>Ray-grass -5</div>	<b>Date de labour</b> <div>Sep-d2</div> <div>Brome stérile -6</div> <div>Vulpin -4</div> <div>Matricaire -1</div> <div>Ray-grass -3</div>	<b>Densité de semis</b> 361 gr/m² <div>Brome stérile -2</div> <div>Vulpin -2</div> <div>Matricaire -2</div> <div>Ray-grass -2</div>
<b>Entre rangs</b> 15 cm <div>Brome stérile -1</div> <div>Vulpin -1</div> <div>Matricaire -1</div> <div>Ray-grass -1</div>	<b>Variété</b> Moyennement couvrante <div>Brome stérile -1</div> <div>Vulpin -1</div> <div>Matricaire -1</div> <div>Ray-grass -1</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Brome stérile 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	<b>Désherbage chimique</b> <div>Oct-d3</div>	<b>Score annuel</b> <div>Brome stérile 51</div> <div>Vulpin 42</div> <div>Matricaire 19</div> <div>Ray-grass 36</div>

## Année 4 - Maïs

### Date de semis

Mai-d2

Brome stérile	2
Vulpin	4
Matricaire	37
Ray-grass	4

### Étouffement culture

Association de cultures :  
Aucune  
Très faible

Brome stérile	0
Vulpin	0
Matricaire	0
Ray-grass	0

### Interculture

Date des faux semis :  
Date de semis du couvert :

Aoû-d3

Date de destruction :

Avr-d3

Brome stérile	0
Vulpin	0
Matricaire	0
Ray-grass	0

### Date de labour

Pas de labour

Brome stérile	0
Vulpin	0
Matricaire	0
Ray-grass	0

### Densité de semis

10.5 gr/m²

Brome stérile	0
Vulpin	0
Matricaire	0
Ray-grass	0

### Entre rangs

75 cm

Brome stérile	0
Vulpin	0
Matricaire	0
Ray-grass	0

### Variété

Moyennement couvrante

Brome stérile	-1
Vulpin	-1
Matricaire	-1
Ray-grass	-1

### Désherbage mécanique

Bineuse :  
Houe rotative :  
Herse étrille :

Brome stérile	0
Vulpin	0
Matricaire	0
Ray-grass	0

### Désherbage chimique

Jun-d2

Mai-d2

Mar-d3

### Score annuel

Brome stérile	1
Vulpin	3
Matricaire	36
Ray-grass	3