

Exploitation : Père d'Henri  
Parcelle : Parcelle n° 1 : MF - B - O  
Type de sol : Argilo-calcaire moyen (60cm)

Commentaires :

  

## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	21	
Vulpin	22	
Laiteron rude	64	

## Système de culture

### Situation initiale :

#### Année 1 - Maïs

<b>Date de semis</b> Avr-d2 Ray-grass 19 Vulpin 21 Laiteron rude 64	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Très faible Ray-grass 0 Vulpin 0 Laiteron rude 0	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Aoû-d2 Jul-d3 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Avr-d1 Ray-grass -4 Vulpin -1 Laiteron rude -2	<b>Date de labour</b> Avr-d2 Ray-grass -8 Vulpin -11 Laiteron rude -4	<b>Densité de semis</b> 9 gr/m² Ray-grass 0 Vulpin 0 Laiteron rude 0
<b>Entre rangs</b> 75 cm Ray-grass 0 Vulpin 0 Laiteron rude 0	<b>Variété</b> Moyennement couvrante Ray-grass -1 Vulpin -1 Laiteron rude -1	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0 Laiteron rude 0	<b>Désherbage chimique</b> Avr-d2	<b>Score annuel</b> Ray-grass 6 Vulpin 8 Laiteron rude 57

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	210 gr/m²
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Laiteron rude 29	Laiteron rude -4	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1	
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 45
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 53
Laiteron rude -2	Laiteron rude -1	Laiteron rude 0		Laiteron rude 23

## Année 3 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Aoû-d3 Jul-d3 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Jan-d1	Pas de labour	210 gr/m²
Ray-grass 33	Ray-grass -10	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 35	Vulpin -10	Vulpin -3	Vulpin 0	Vulpin 0
Laiteron rude 46	Laiteron rude -10	Laiteron rude -2	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d1 Avr-d3 Avr-d2	
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 15
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 20
Laiteron rude -2	Laiteron rude -1	Laiteron rude 0		Laiteron rude 31