



Exploitation : Arnaud\_FISA\_Evapsys  
Parcelle : le parc  
Type de sol : limons profonds argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	17	
Chénopode	59	
Laiteron rude	52	
Vulpin	15	
Renouée liseron	35	

## Système de culture

Situation initiale :

## Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Sep-d3 Date de semis du couvert : Jun-d3 Date de destruction : Sep-d3	Pas de labour	250 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 35	Ray-grass -6	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Chénopode 8	Chénopode -6	Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0
Laiteron rude 28	Laiteron rude -6	Laiteron rude -1	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Vulpin 35	Vulpin -6	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herve étrille : Ray-grass -1 Chénopode -1 Laiteron rude -1 Vulpin -1 Renouée liseron -1	Nov-d2	Ray-grass 21 Chénopode 0 Laiteron rude 18 Vulpin 21 Renouée liseron 0
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0		
Laiteron rude -2	Laiteron rude -1	Laiteron rude 0		
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		
Renouée liseron -2	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		

## Année 2 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Mar-d3 Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Nov-d2	Nov-d2	3.5 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -7	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Chénopode 63	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Laiteron rude 57	Laiteron rude 0	Laiteron rude -3	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0
Renouée liseron 127	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
90 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herve étrille : Ray-grass -1 Chénopode -1 Laiteron rude -1 Vulpin -1 Renouée liseron -1	Mai-d2	Ray-grass 9 Chénopode 56 Laiteron rude 51 Vulpin 9 Renouée liseron 117
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0		
Laiteron rude 0	Laiteron rude -1	Laiteron rude 0		
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		
Renouée liseron 0	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		

### Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 52	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Chénopode 11	Chénopode -6	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Laiteron rude 29	Laiteron rude -6	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Vulpin 60	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1	Ray-grass 42
Ray-grass -2	Ray-grass -2	Ray-grass 0		Chénopode 1
Chénopode -2	Chénopode -2	Chénopode 0		Laiteron rude 19
Laiteron rude -2	Laiteron rude -2	Laiteron rude 0		Vulpin 50
Vulpin -2	Vulpin -2	Vulpin 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron -2	Renouée liseron -2	Renouée liseron 0		

### Année 4 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Nov-d3	Déc-d1	10 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 35	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Chénopode 64	Chénopode -10	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0
Laiteron rude 38	Laiteron rude -10	Laiteron rude 0	Laiteron rude -3	Laiteron rude 0
Vulpin 38	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin -9	Vulpin 0
Renouée liseron 58	Renouée liseron -10	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Très couvrante	Bineuse : Mai-d1 Avr-d3 Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d1 Avr-d3 Avr-d2 Avr-d1	Ray-grass 14
Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass -2		Chénopode 44
Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -6		Laiteron rude 17
Laiteron rude 0	Laiteron rude -2	Laiteron rude -6		Vulpin 15
Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin -2		Renouée liseron 27
Renouée liseron 0	Renouée liseron -2	Renouée liseron -13		

### Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	300 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 7	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Chénopode 6	Chénopode -6	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Laiteron rude 23	Laiteron rude -6	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Vulpin 8	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass -2	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Chénopode -2	Chénopode -2	Chénopode 0		Chénopode 0
Laiteron rude -2	Laiteron rude -2	Laiteron rude 0		Laiteron rude 13
Vulpin -2	Vulpin -2	Vulpin 0		Vulpin 0
Renouée liseron -2	Renouée liseron -2	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0

### Année 6 - Autre culture de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Nov-d2	Nov-d3	90 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 27	Ray-grass 0	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Chénopode 66	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Laiteron rude 53	Laiteron rude 0	Laiteron rude -3	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Vulpin 28	Vulpin 0	Vulpin -9	Vulpin 0	Vulpin 0
Renouée liseron 108	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
36 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d2 Mai-d1 Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d2 Mai-d1 Avr-d3	
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -1		Ray-grass 20
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -6		Chénopode 58
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude -6		Laiteron rude 44
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -2		Vulpin 18
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -14		Renouée liseron 88

## Année 7 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	260 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 35	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Chénopode 8	Chénopode -6	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Laiteron rude 28	Laiteron rude -6	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Vulpin 35	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0		Ray-grass 26
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Chénopode -2	Chénopode -1	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 19
Laiteron rude -2	Laiteron rude -1	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 26
Vulpin -2	Vulpin -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Renouée liseron -2	Renouée liseron -1			

## Année 8 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Nov-d3	Déc-d1	110 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 33	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Chénopode 66	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0
Laiteron rude 46	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude -3	Laiteron rude 0
Vulpin 35	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -9	Vulpin 0
Renouée liseron 85	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	Avr-d1	Ray-grass 25
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Chénopode 0		Chénopode 63
Chénopode 0	Chénopode -1	Laiteron rude 0		Laiteron rude 42
Laiteron rude 0	Laiteron rude -1	Vulpin 0		Vulpin 26
Vulpin 0	Vulpin -1	Renouée liseron 0		Renouée liseron 78
Renouée liseron 0	Renouée liseron -1			