




Scénario : Nouveau scénario
Exploitation : EARL Saint Léger
Parcelle : la longue haie
Type de sol : limon moyen à profond

Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : |
|--------------------------------|--|
| Ray-grass | 25 (25)  |
| Ambroisie à feuilles d'armoise | 34 (34)  |
| Vulpin | 17 (17)  |

Système de culture

Scénario :

Année 1 - Blé d'hiver

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| <p>Date de semis</p> <p>Nov-d1</p> <p>Ray-grass 18</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 2</p> <p>Vulpin 14</p> | <p>Étouffement culture</p> <p>Association de cultures : Aucune Faible</p> <p>Ray-grass -4</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise -4</p> <p>Vulpin -4</p> | <p>Interculture</p> <p>Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Vulpin 0</p> | <p>Date de labour</p> <p>Pas de labour</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Vulpin 0</p> | <p>Densité de semis</p> <p>190 gr/m²</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Vulpin 0</p> |
| <p>Entre rangs</p> <p>15 cm</p> <p>Ray-grass -1</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise -1</p> <p>Vulpin -1</p> | <p>Variété</p> <p>Moyennement couvrante</p> <p>Ray-grass -1</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise -1</p> <p>Vulpin -1</p> | <p>Désherbage mécanique</p> <p>Bineuse : Nov-d1</p> <p>Houe rotative :</p> <p>Herse étrille :</p> <p>Ray-grass -2</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Vulpin -1</p> | <p>Désherbage chimique</p> <p>Mar-d2 Avr-d3 Déc-d3</p> | <p>Score annuel</p> <p>Ray-grass 10</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Vulpin 7</p> |

Année 2 - Colza d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---|--|--|---|--|
| <p>Aoû-d2</p> <p>Ray-grass 88</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 11</p> <p>Vulpin 68</p> | <p>Association de cultures : Aucune</p> <p>Moyen</p> <p>Ray-grass -6</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise -6</p> <p>Vulpin -6</p> | <p>Date des faux semis : Non définie</p> <p>Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Vulpin 0</p> | <p>Pas de labour</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Vulpin 0</p> | <p>1.99 gr/m²</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Vulpin 0</p> |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| <p>45 cm</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Vulpin 0</p> | <p>Très couvrante</p> <p>Ray-grass -2</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise -2</p> <p>Vulpin -2</p> | <p>Bineuse : Sep-d2</p> <p>Houe rotative :</p> <p>Herse étrille :</p> <p>Ray-grass -5</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise -0</p> <p>Vulpin -5</p> | <p>Avr-d3 Oct-d2 Oct-d3</p> | <p>Ray-grass 75</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 2</p> <p>Vulpin 55</p> |

Année 3 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|--|---|--|---|---|
| <p>Nov-d3</p> <p>Ray-grass 4</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 2</p> <p>Vulpin 4</p> | <p>Association de cultures : Aucune</p> <p>Faible</p> <p>Ray-grass -4</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise -4</p> <p>Vulpin -4</p> | <p>Date des faux semis : Non définie</p> <p>Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Vulpin 0</p> | <p>Pas de labour</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Vulpin 0</p> | <p>200 gr/m²</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Vulpin 0</p> |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| <p>15 cm</p> <p>Ray-grass -1</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise -1</p> <p>Vulpin -1</p> | <p>Moyennement couvrante</p> <p>Ray-grass -1</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise -1</p> <p>Vulpin -1</p> | <p>Bineuse : Non définie</p> <p>Houe rotative :</p> <p>Herse étrille :</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Vulpin 0</p> | <p>Jan-d3 Avr-d3 Nov-d3</p> | <p>Ray-grass 0</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Vulpin 0</p> |

Année 4 - Betteraves

| | | | | |
|---|--|---|--|---|
| Date de semis <div>Mar-d3</div> <div>Ray-grass 33</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise 65</div> <div>Vulpin 35</div> | Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible <div>Ray-grass 0</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</div> <div>Vulpin 0</div> | Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Aoû-d2</div> Date de destruction : <div>Nov-d2</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</div> <div>Vulpin 0</div> | Date de labour <div>Fév-d3</div> <div>Ray-grass -2</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise -1</div> <div>Vulpin -2</div> | Densité de semis 1.22 gr/m² <div>Ray-grass 0</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</div> <div>Vulpin 0</div> |
| Entre rangs 15 cm <div>Ray-grass 0</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</div> <div>Vulpin 0</div> | Variété Moyennement couvrante <div>Ray-grass -1</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise -1</div> <div>Vulpin -1</div> | Désherbage mécanique Bineuse : <div>Mai-d3</div> Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass 0</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise -5</div> <div>Vulpin 0</div> | Désherbage chimique <div>Mar-d3</div> <div>Avr-d3</div> <div>Mai-d1</div> | Score annuel <div>Ray-grass 30</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise 59</div> <div>Vulpin 32</div> |