

Exploitation :

Conception Agrosystème

Parcelle :




Haves2

Type de sol :

Craie

Commentaires :


Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	18	
Gaillet	12	
Coquelicot	47	
Renouée liseron	33	
Chénopode	54	

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Luzerne



Année 2 - Blé d'hiver



Année 3 - Maïs



Année 4 - Pois d'hiver



Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Jan-d2	Pas de labour	300 gr/m ²
Ray-grass 0	Ray-grass -4	Date de semis du couvert : Non définie	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 0	Gaillet -4	Date de destruction : Non définie	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 0	Coquelicot -4		Coquelicot 0	Coquelicot 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -4		Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Chénopode 0	Chénopode -4		Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
7.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herve étrille : Ray-grass 0	Sep-d2 Fév-d3	Ray-grass 0
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Chénopode -2	Chénopode 0			

Année 6 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d1	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Jul-d1	Jul-d1	45 gr/m ²
Ray-grass 73	Ray-grass -6	Date de semis du couvert : Non définie	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Gaillet 5	Gaillet -6	Date de destruction : Non définie	Gaillet -4	Gaillet 0
Coquelicot 19	Coquelicot -6		Coquelicot -2	Coquelicot 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -6		Renouée liseron -4	Renouée liseron 0
Chénopode 35	Chénopode -6		Chénopode -2	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herve étrille : Ray-grass 0	Nov-d1 Mar-d2 Jan-d2	Ray-grass 62
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Coquelicot 0	Coquelicot 9	Coquelicot 9
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Chénopode 0	Chénopode 24	Chénopode 24
Chénopode -2	Chénopode 0			

Année 7 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d2 Ray-grass 4 Gaillet 0 Coquelicot 16 Renouée liseron 111 Chénopode 52	Association de cultures : Aucune Très faible Ray-grass 0 Gaillet 0 Coquelicot 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Jul-d1 Date de destruction : Avr-d2 Ray-grass 0 Gaillet 0 Coquelicot 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0	Pas de labour Ray-grass 0 Gaillet 0 Coquelicot 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0	110 gr/m ² Ray-grass 0 Gaillet 0 Coquelicot 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0
Entre rangs 14 cm Ray-grass -2 Gaillet -2 Coquelicot -2 Renouée liseron -2 Chénopode -2	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Gaillet 0 Coquelicot 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Gaillet 0 Coquelicot 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0	Désherbage chimique Mar-d2 Fév-d2 Ray-grass 2 Gaillet 0 Coquelicot 14 Renouée liseron 109 Chénopode 50	Score annuel Ray-grass 2 Gaillet 0 Coquelicot 14 Renouée liseron 109 Chénopode 50