




Exploitation : Gaec lacoste
Parcelle : Maïs
Type de sol : limon

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Alchémille	0 
Brome mou	0 
Datura stramoine	11 

Complément à OdERA concernant le Datura en culture légumière

Le datura est une adventice particulière, tant par sa biologie que par sa toxicité, qui nécessite une gestion spécifique en système légumier, en plus des moyens agronomiques déjà pris en compte dans OdERA.

Grille 1 : Risque toxicité vis-à-vis du datura

La grille ci-dessous vise à affiner le diagnostic OdERA pour le datura en culture légumière au regard des pratiques à risque mises en place. Elle se lit de gauche à droite, et de haut en bas. A chaque fin de ligne, noter le nombre de points obtenus, et faire le total une fois la grille finie.

Pratiques et observations sur la parcelle					Points	Commentaires
Le Datura est-il présent sur la parcelle ?	Cultures précédentes sur la rotation	Datura ayant levé	> 2 pieds /ha	Montée à graine	5	La forte persistance des graines de datura dans le sol (TAD ≈30 %) accroît le risque de présence si détection (voir montée à graine) dans les cultures précédentes. Le seuil de 2 pieds /ha se justifie par le nombre de graines par pied et la teneur en alcaloïdes des graines. Le seuil bas témoigne ainsi de la toxicité importante du datura.
			< 2 pieds /ha	Pas de montée à graine	4	
			Montée à graine		4	
			Pas de montée à graine		3	
	En culture légumière	Binage et irrigation	Parcelle irriguée et binée		3	Une parcelle irriguée signifie fréquemment un binage en conditions humides (même légèrement). Celui-ci provoque des levées de dormance des graines de datura et accroît ainsi le risque de présence.
			Binage après 30 jours post semis		5	Un binage tardif perd en efficacité. Il existe alors un risque d'accélérer le développement des pieds restants.
		Désherbage chimique efficace sur Datura	première intervention après 20 jours post semis (hors PS/PL)		3	L'efficacité du désherbage chimique est réduite avec le développement du datura. Une stratégie de maîtrise du datura basée sur le désherbage chimique, si celui-ci est positionné tardivement, entraîne des risques de datura à la récolte de la culture légumière.
		Préparation de sol prévue	Très fine		5	Le levier principal pour lever la dormance du datura est la scarification de la graine. Plus la préparation de sol sera fine, plus les graines seront scarifiées par les outils et lèveront.
			Fine		3	
			Moyenne		1	
		Moyen spécifiques : Gestion des bordures Trains de tonneaux et d'irrigations broyés Arrachage	Plus de 4 moyens utilisés		1	Un panel de pratiques de gestion intra et péri-parcellaires peuvent limiter le risque de développement du datura : entretien des bordures, des trains de tonneaux et d'irrigation, arrachage manuel des pieds, nettoyage
			Entre 3 et 4		3	

		manuel des pieds Nettoyage du matériel entre les parcelles Apport organique composté	Moins de 2	5	du matériel entre les parcelles et apport de matière organique compostée. Leur non-mise en place en situation de présence de datura accroît le risque datura à la récolte
Non	Nettoyage du matériel entre les parcelles	Non	2	Comme toutes les adventices, le nettoyage du matériel de moisson ou de travail du sol permet de limiter les contaminations entre les parcelles.	
	Apport organique	Non composté	2	L'apport de graines via des matières organiques exogènes est possible. Le compostage est un moyen efficace de réduire ce risque, car il va dégrader les graines d'adventices.	
Total des points					

Grille 2 : Couplage toxicité/système

Cette grille permet de lier la note obtenue dans le tableau précédent et votre note OdERA, afin de prioriser les changements pour être plus défavorable au datura.

Note grille risque toxicité vis-à-vis du datura				
		0-4 (absence datura)	5-16	> 16
Classe OdERA (risque système)	Risque très faible	Les pratiques actuelles du système de culture ne favorisent pas l'apparition du datura, et les pratiques spécifiques au datura sont adaptées. Le risque d'infestation est uniquement présent par les apports exogènes.	Les pratiques du système de culture ne sont pas favorables au développement du datura (présent antérieurement sur la parcelle). Les pratiques spécifiques présentent des risques modérés de développement du datura. Si levée de datura, adapter les pratiques en culture légumière et ne pas baisser la vigilance.	Les pratiques du système de culture sont peu favorables au développement du datura, mais les pratiques spécifiques présentent un risque fort pour la toxicité. Vigilance soutenue si levée de datura, risque de forte expansion en parcelle et d'augmentation du stock semencier.
	Risque faible		Les pratiques du système de culture sont peu favorables au développement du datura en parcelle mais la vigilance est accentuée par la présence de l'adventice précédemment dans la parcelle. De plus, les pratiques spécifiques présentent des risques modérés pour la toxicité de cette adventice.	
	Risque assez faible			
	Risque moyen	Les pratiques du système de culture ne permettent pas de limiter l'apparition du datura. Les pratiques plus spécifiques au datura présentent par contre peu de risque pour son développement.	Le système de culture et les pratiques spécifique de gestion présentent des risques de développement du datura, voir d'expansion sur la parcelle. Il faut modifier les pratiques au niveau du système de culture pour abaisser la pression et adapter les pratiques pour mieux gérer le risque toxicité.	Des changements profonds sur les pratiques, tant sur le système de culture que sur les pratiques spécifiques sont à prévoir, pour arriver à une gestion efficace du datura sur cette parcelle.
	Risque élevé	Les pratiques du système de culture sont à risque pour l'apparition du datura, malgré des pratiques pour gérer le datura adaptées. Il faut être attentif à son apparition, et peut être modifier les pratiques systèmes pour qu'elles soient moins favorable au datura.	Les pratiques du système de culture sont très favorables au développement du datura et les pratiques spécifiques peuvent accentuer son expansion. Faire évoluer le système de culture et adapter les pratiques pour limiter le risque de toxicité.	
	Risque très élevé			

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Maïs

Date de semis

Avr-d1

Alchémille 9

Brome mou 14

Datura stramoine
25

Étouffement culture

Association de cultures :
Luzerne
Fort

Alchémille -10

Brome mou -10

Datura stramoine
-10

Interculture

Date des faux semis :

Sep-d3

Aoû-d3

Avr-d3

Avr-d2

Avr-d1

Date de semis du couvert :

Avr-d2

Date de destruction :

Jun-d1

Alchémille -7

Brome mou -13

Datura stramoine -3

Date de labour

Pas de labour

Alchémille 0

Brome mou 0

Datura stramoine
0

Densité de semis

Non défini

Alchémille 0

Brome mou 0

Datura stramoine
0

Entre rangs

Non défini

Alchémille 0

Brome mou 0

Datura stramoine
0

Variété

Non couvrante

Alchémille 0

Brome mou 0

Datura stramoine
0

Désherbage mécanique

Bineuse :

Houe rotative :

Herse étrille :

Alchémille 0

Brome mou 0

Datura stramoine 0

Désherbage chimique

Score annuel

Alchémille 0

Brome mou 0

Datura stramoine
12