

Exploitation : SCEA Veget'o  
 Parcelle : la rabine  
 Type de sol : limono-argileux

Commentaires :

  


## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	38
Ray-grass	25
Mercuriale	45
Morelle	18

## Système de culture

### Situation initiale :

#### Année 1 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3 Chénopode 66 Ray-grass 33 Mercuriale 50 Morelle 3	Association de cultures : Haricot Fort Chénopode -10 Ray-grass -10 Mercuriale -10 Morelle -10	Date des faux semis : Jun-d3 Mar-d2 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Fév-d1 Chénopode -4 Ray-grass -2 Mercuriale -3 Morelle -6	Fév-d2 Chénopode -3 Ray-grass -7 Mercuriale -4 Morelle -3	90 gr/m <sup>2</sup> Chénopode 0 Ray-grass 0 Mercuriale 0 Morelle 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm Chénopode 0 Ray-grass 0 Mercuriale 0 Morelle 0	Moyennement couvrante Chénopode -1 Ray-grass -1 Mercuriale -1 Morelle -1	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Ray-grass 0 Mercuriale 0 Morelle 0	Aoû-d1 Jul-d3 Jul-d1 Mai-d1 Avr-d1	Chénopode 48 Ray-grass 13 Mercuriale 32 Morelle 0

### **Année 2 - Blé d'hiver**

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Non défini Date de semis du couvert : Non défini Date de destruction : Non définie	Pas de labour	275 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Mercuriale 26	Mercuriale -4	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Morelle 0	Morelle -4	Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3 Mar-d2	Chénopode 4
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 4	Ray-grass 45
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 45	Mercuriale 19
Mercuriale -2	Mercuriale -1	Mercuriale 0	Mercuriale 19	Morelle 0
Morelle -2	Morelle -1	Morelle 0	Morelle 0	

Année 3 - Autre culture d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Aoû-d2 Aoû-d1 Jul-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Aoû-d1	670 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 9	Chénopode -6	Chénopode -5	Chénopode -4	Chénopode 0
Ray-grass 66	Ray-grass -6	Ray-grass -6	Ray-grass -9	Ray-grass 0
Mercuriale 32	Mercuriale -6	Mercuriale -1	Mercuriale -4	Mercuriale 0
Morelle 1	Morelle -6	Morelle -11	Morelle -5	Morelle 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1 Mar-d2	Chénopode 0
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0		Ray-grass 44
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Mercuriale 20
Mercuriale 0	Mercuriale -1	Mercuriale 0		Morelle 0
Morelle 0	Morelle -1	Morelle 0		

## Année 4 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Avr-d1 Mar-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Fév-d2 Chénopode -3 Ray-grass -7 Mercuriale -4 Morelle -3	90 gr/m <sup>2</sup> Chénopode 0 Ray-grass 0 Mercuriale 0 Morelle 0
Chénopode 62 Ray-grass 12 Mercuriale 111 Morelle 52	Chénopode 0 Ray-grass 0 Mercuriale 0 Morelle 0	Chénopode -6 Ray-grass -4 Mercuriale -2 Morelle 0		
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
75 cm Chénopode 0 Ray-grass 0 Mercuriale 0 Morelle 0	Non couvrante Chénopode 0 Ray-grass 0 Mercuriale 0 Morelle 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Ray-grass 0 Mercuriale 0 Morelle 0	Mai-d2	Chénopode 53 Ray-grass 2 Mercuriale 106 Morelle 49

## Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3 Chénopode 8 Ray-grass 35 Mercuriale 18 Morelle 0	Association de cultures : Aucune Faible Chénopode -4 Ray-grass -4 Mercuriale -4 Morelle -4	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode 0 Ray-grass 0 Mercuriale 0 Morelle 0	Oct-d3 Chénopode -3 Ray-grass -10 Mercuriale -5 Morelle -3	300 gr/m <sup>2</sup> Chénopode 0 Ray-grass 0 Mercuriale 0 Morelle 0
Entre rangs 12.5 cm Chénopode -2 Ray-grass -2 Mercuriale -2 Morelle -2	Moyennement couvrante Chénopode -1 Ray-grass -1 Mercuriale -1 Morelle -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Ray-grass 0 Mercuriale 0 Morelle 0	Oct-d3 Mar-d1 Oct-d3 Chénopode 0 Ray-grass 17 Mercuriale 6 Morelle 0	Score annuel Chénopode 0 Ray-grass 17 Mercuriale 6 Morelle 0

## Année 6 - Autre culture d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Aoû-d2 Aoû-d1 Jul-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Aoû-d1	670 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 9 Ray-grass 66 Mercuriale 32 Morelle 1	Chénopode -6 Ray-grass -6 Mercuriale -6 Morelle -6	Chénopode -5 Ray-grass -6 Mercuriale -1 Morelle -11	Chénopode -4 Ray-grass -9 Mercuriale -4 Morelle -5	Chénopode 0 Ray-grass 0 Mercuriale 0 Morelle 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2 Mar-d2	Chénopode 0 Ray-grass 44 Mercuriale 20 Morelle 0
Chénopode 0 Ray-grass 0 Mercuriale 0 Morelle 0	Chénopode -1 Ray-grass -1 Mercuriale -1 Morelle -1	Chénopode 0 Ray-grass 0 Mercuriale 0 Morelle 0		