

Exploitation : SCEA Veget'o
 Parcelle : la rabine
 Type de sol : limono-argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	35
Ray-grass	14
Mercuriale	40
Morelle	15

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3 Chénopode 66 Ray-grass 33 Mercuriale 50 Morelle 3	Association de cultures : Haricot Fort Chénopode -10 Ray-grass -10 Mercuriale -10 Morelle -10	Date des faux semis : Mar-d2 Jun-d3 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Fév-d1 Chénopode -4 Ray-grass -2 Mercuriale -3 Morelle -6	Fév-d2 Chénopode -3 Ray-grass -7 Mercuriale -4 Morelle -3	90 gr/m² Chénopode 0 Ray-grass 0 Mercuriale 0 Morelle 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm Chénopode 0 Ray-grass 0 Mercuriale 0 Morelle 0	Moyennement couvrante Chénopode -1 Ray-grass -1 Mercuriale -1 Morelle -1	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Ray-grass 0 Mercuriale 0 Morelle 0	Avr-d1 Mai-d1 Jul-d1 Jul-d3 Aoû-d1	Chénopode 48 Ray-grass 13 Mercuriale 32 Morelle 0

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Non définie Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	275 gr/m ²
Chénopode 6 Ray-grass 7 Mercuriale 3 Morelle 0	Chénopode -4 Ray-grass -4 Mercuriale -4 Morelle -4	Chénopode 0 Ray-grass 0 Mercuriale 0 Morelle 0	Chénopode 0 Ray-grass 0 Mercuriale 0 Morelle 0	Chénopode 0 Ray-grass 0 Mercuriale 0 Morelle 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2 Oct-d3	Chénopode 0 Ray-grass 0 Mercuriale 0 Morelle 0
Chénopode -2 Ray-grass -2 Mercuriale -2 Morelle -2	Chénopode -1 Ray-grass -1 Mercuriale -1 Morelle -1	Chénopode 0 Ray-grass 0 Mercuriale 0 Morelle 0		

Année 3 - Autre culture d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Jul-d3 Aoû-d1 Aoû-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Aoû-d1	670 gr/m ²
Chénopode 9 Ray-grass 66 Mercuriale 32 Morelle 1	Chénopode -6 Ray-grass -6 Mercuriale -6 Morelle -6	Chénopode -5 Ray-grass -6 Mercuriale -1 Morelle -11	Chénopode -4 Ray-grass -9 Mercuriale -4 Morelle -5	Chénopode 0 Ray-grass 0 Mercuriale 0 Morelle 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2 Nov-d1	Chénopode 0 Ray-grass 44 Mercuriale 20 Morelle 0
Chénopode 0 Ray-grass 0 Mercuriale 0 Morelle 0	Chénopode -1 Ray-grass -1 Mercuriale -1 Morelle -1	Chénopode 0 Ray-grass 0 Mercuriale 0 Morelle 0		

Année 4 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Mar-d2 Avr-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Fév-d2	90 gr/m ²
Chénopode 62	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Ray-grass 12	Ray-grass 0	Ray-grass -7	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Mercuriale 111	Mercuriale 0	Mercuriale -4	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Morelle 52	Morelle 0	Morelle -3	Morelle 0	Morelle 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
75 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d2 Houe rotative : Mai-d2 Herse étrille : Chénopode -4 Ray-grass -0 Mercuriale -10 Morelle -8	Mai-d2	Chénopode 49 Ray-grass 2 Mercuriale 96 Morelle 42
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -4		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -0		
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -10		
Morelle 0	Morelle 0	Morelle -8		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d3	300 gr/m ²
Chénopode 6	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode 0
Ray-grass 7	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass -10	Ray-grass 0
Mercuriale 3	Mercuriale -4	Mercuriale 0	Mercuriale -5	Mercuriale 0
Morelle 0	Morelle -4	Morelle 0	Morelle -3	Morelle 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Ray-grass 0 Mercuriale 0 Morelle 0	Mar-d1 Oct-d3	Chénopode 0 Ray-grass 0 Mercuriale 0 Morelle 0
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0		
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Mercuriale -2	Mercuriale -1	Mercuriale 0		
Morelle -2	Morelle -1	Morelle 0		

Année 6 - Autre culture d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Jul-d3 Aoû-d1 Aoû-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Aoû-d1	670 gr/m ²
Chénopode 9 Ray-grass 66 Mercuriale 32 Morelle 1	Chénopode -6 Ray-grass -6 Mercuriale -6 Morelle -6	Chénopode -5 Ray-grass -6 Mercuriale -1 Morelle -11	Chénopode -4 Ray-grass -9 Mercuriale -4 Morelle -5	Chénopode 0 Ray-grass 0 Mercuriale 0 Morelle 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2 Nov-d2	Chénopode 0 Ray-grass 44 Mercuriale 20 Morelle 0
Chénopode 0 Ray-grass 0 Mercuriale 0 Morelle 0	Chénopode -1 Ray-grass -1 Mercuriale -1 Morelle -1	Chénopode 0 Ray-grass 0 Mercuriale 0 Morelle 0		