


Exploitation : SCEA de la Glayère
Parcelle : Jaunes terre
Type de sol : calcaire

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	<div>34</div> 

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Sep-d3</div> <div>Chénopode 21</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible <div>Chénopode -4</div>	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Chénopode 0</div>	Date de labour <div>Aoû-d3</div> <div>Chénopode -1</div>	Densité de semis 250 gr/m² <div>Chénopode 0</div>
Entre rangs 12 cm <div>Chénopode -2</div>	Variété Très couvrante <div>Chénopode -2</div>	Désherbage mécanique Bineuse : <div>Fév-d1</div> Houe rotative : Herse étrille : <div>Fév-d2</div> <div>Chénopode -1</div>	Désherbage chimique <div>Mar-d2</div>	Score annuel <div>Chénopode 11</div>

Année 2 - Orge de printemps

Date de semis <div>Fév-d3</div> <div>Chénopode 49</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Fort <div>Chénopode -10</div>	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Chénopode 0</div>	Date de labour <div>Jan-d3</div> <div>Chénopode -1</div>	Densité de semis 300 gr/m² <div>Chénopode 0</div>
Entre rangs 12 cm <div>Chénopode -2</div>	Variété Moyennement couvrante <div>Chénopode -1</div>	Désherbage mécanique Bineuse : <div>Mar-d1</div> Houe rotative : Herse étrille : <div>Mar-d2</div> <div>Chénopode -5</div>	Désherbage chimique <div>Mar-d3</div>	Score annuel <div>Chénopode 30</div>