


Exploitation : SCEA de la Glayère  
Parcelle : Jaunes terre  
Type de sol : calcaire

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	<div>1</div> 

## Système de culture

Situation initiale :

### Année 1 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> <div>Oct-d1</div> <div>Chénopode 15</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Faible <div>Chénopode -4</div>	<b>Interculture</b> Date des faux semis : <div>Oct-d1</div> <div>Sep-d3</div> Date de semis du couvert : <div>Oct-d1</div> Date de destruction : <div>Oct-d3</div> <div>Chénopode -2</div>	<b>Date de labour</b> <div>Aoû-d3</div> <div>Chénopode -4</div>	<b>Densité de semis</b> 350 gr/m² <div>Chénopode 0</div>
<b>Entre rangs</b> 10 cm <div>Chénopode -2</div>	<b>Variété</b> Très couvrante <div>Chénopode -2</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : <div>Fév-d1</div> Houe rotative : Herse étrille : <div>Oct-d3</div> <div>Chénopode -1</div>	<b>Désherbage chimique</b> <div>Mar-d2</div>	<b>Score annuel</b> <div>Chénopode 1</div>

### Année 2 - Orge de printemps

<b>Date de semis</b> <div>Jan-d2</div> <div>Chénopode 8</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Fort <div>Chénopode -10</div>	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Nov-d1</div> Date de destruction : <div>Jan-d2</div> <div>Chénopode 0</div>	<b>Date de labour</b> <div>Jan-d1</div> <div>Chénopode -2</div>	<b>Densité de semis</b> 350 gr/m² <div>Chénopode 0</div>
<b>Entre rangs</b> 12 cm <div>Chénopode -2</div>	<b>Variété</b> Très couvrante <div>Chénopode -2</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : <div>Mar-d1</div> Houe rotative : Herse étrille : <div>Mar-d2</div> <div>Chénopode -5</div>	<b>Désherbage chimique</b> <div>Mar-d3</div>	<b>Score annuel</b> <div>Chénopode 0</div>

