

Exploitation : SCEA de l'haezpöel
 Parcelle : Chapelle
 Type de sol : Limon - sableux

Commentaires :


Scénario initial

Adventices étudiées :



Système de culture

Situation initiale :



Année 2 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Aoû-d2 Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Avr-d2	Avr-d3	4 gr/m ²
Chénopode 57	Chénopode -10	Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0
Ray-grass 12	Ray-grass -10	Ray-grass -3	Ray-grass -2	Ray-grass 0
Laiteron rude 61	Laiteron rude -10	Laiteron rude -1	Laiteron rude -1	Laiteron rude 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
75 cm	Non couvrante	Bineuse : Non définie Houe rotative : Non définie Herse étrille : Non définie	Mai-d2	Chénopode 44 Ray-grass 0 Laiteron rude 49
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Non définie Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d3	400 gr/m ²
Chénopode 8	Chénopode -6	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode -2
Ray-grass 35	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass -3	Ray-grass -2
Laiteron rude 28	Laiteron rude -6	Laiteron rude 0	Laiteron rude -1	Laiteron rude -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
14 cm	Très couvrante	Bineuse : Non définie Houe rotative : Non définie Herse étrille : Non définie	Nov-d2	Chénopode 0 Ray-grass 21 Laiteron rude 16
Chénopode -1	Chénopode -2	Chénopode 0		
Ray-grass -1	Ray-grass -2	Ray-grass 0		
Laiteron rude -1	Laiteron rude -2	Laiteron rude 0		

Année 4 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Non définie Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Avr-d2	Avr-d2	11 gr/m ²
Chénopode 62	Chénopode -10	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0
Ray-grass 12	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0
Laiteron rude 67	Laiteron rude -10	Laiteron rude 0	Laiteron rude -1	Laiteron rude 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
75 cm	Très couvrante	Bineuse : Jun-d1 Houe rotative : Non définie Herse étrille : Non définie	Mai-d3	Chénopode 47
Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Laiteron rude -3	Laiteron rude 51
Laiteron rude 0	Laiteron rude -2	Laiteron rude -3		