

Exploitation : EARL Bertrand
Parcelle : Sortie village Pelves
Type de sol : Argilo-limoneux

Commentaires :

Rotation : Betterave-Blé d'hiver-Maïs

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Chénopode	72	
Renouée liseron	58	
Vulpin	28	

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Betteraves

<p>Date de semis</p> <p>Mar-d3</p> <p>Chénopode 66</p> <p>Renouée liseron 85</p> <p>Vulpin 35</p>	<p>Étouffement culture</p> <p>Association de cultures : Aucune</p> <p>Très faible</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>Interculture</p> <p>Date des faux semis : Jul-d3</p> <p>Date de semis du couvert : Sep-d2</p> <p>Date de destruction : Nov-d1</p> <p>Chénopode -2</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>Date de labour</p> <p>Oct-d2</p> <p>Chénopode -1</p> <p>Renouée liseron -2</p> <p>Vulpin -4</p>	<p>Densité de semis</p> <p>15 gr/m²</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Vulpin 0</p>
<p>Entre rangs</p> <p>45 cm</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>Variété</p> <p>Moyennement couvrante</p> <p>Chénopode -1</p> <p>Renouée liseron -1</p> <p>Vulpin -1</p>	<p>Désherbage mécanique</p> <p>Bineuse : Jul-d2</p> <p>Houe rotative :</p> <p>Herse étrille :</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>Désherbage chimique</p> <p>Mai-d3 Mai-d1 Avr-d3</p> <p>Avr-d2</p>	<p>Score annuel</p> <p>Chénopode 63</p> <p>Renouée liseron 82</p> <p>Vulpin 30</p>

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Jul-d3 Date de semis du couvert : Sep-d2 Date de destruction : Nov-d1	Oct-d1	300 gr/m²
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2	Renouée liseron 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
25 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Fév-d3	
Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0		Chénopode 2
Renouée liseron 0	Renouée liseron -2	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin 0		Vulpin 49

Année 3 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Jul-d3 Date de semis du couvert : Sep-d2 Date de destruction : Nov-d1	Mar-d1	10 gr/m²
Chénopode 68	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0
Renouée liseron 134	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2	Renouée liseron 0
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -3	Vulpin 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
75 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d1	
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 64
Renouée liseron 0	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		Renouée liseron 132
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 18