

Exploitation : Non renseigné
Parcelle : Champs de bray
Type de sol : argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Chénopode	23	
Ray-grass	40	
Amarante réfléchie	33	

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Blé de printemps Fort	Date des faux semis : Aoû-d1	Aoû-d1	500 gr/m²
Chénopode 27	Chénopode -10	Date de semis du couvert : Non définie	Chénopode -4	Chénopode 0
Ray-grass 97	Ray-grass -10	Date de destruction : Avr-d3	Ray-grass -9	Ray-grass 0
Amarante réfléchie 20	Amarante réfléchie -10	Chénopode -2	Amarante réfléchie -7	Amarante réfléchie 0
		Ray-grass -2		
		Amarante réfléchie -4		
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
10 cm	Très couvrante	Bineuse : Aoû-d1		Chénopode 8
Chénopode 0	Chénopode -2	Houe rotative :		Ray-grass 73
Ray-grass 0	Ray-grass -2	Herse étrille :		Amarante réfléchie 0
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -2	Chénopode -2		
		Ray-grass -2		
		Amarante réfléchie -4		

Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Jul-d2	Association de cultures : Féverole d'hiver Fort	Date des faux semis : Aoû-d3	Pas de labour	300 gr/m²
Chénopode 36	Chénopode -10	Date de semis du couvert : Non définie	Chénopode 0	Chénopode 0
Ray-grass 33	Ray-grass -10	Date de destruction : Non définie	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Amarante réfléchie 81	Amarante réfléchie -10	Chénopode -2	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0
		Ray-grass -4		
		Amarante réfléchie -2		
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
25 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Sep-d3		Chénopode 20
Chénopode -2	Chénopode -1	Houe rotative :		Ray-grass 12
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Herse étrille :		Amarante réfléchie 65
Amarante réfléchie -2	Amarante réfléchie -1	Chénopode -1		
		Ray-grass -5		
		Amarante réfléchie -1		