



Exploitation :  
Parcelle :  
Type de sol :

GAEC du plateau  
1  
limoneux

Commentaires :

parcelle type numéro 1

Adventices étudiées :

| Adventices :        | Risque :   |
|---------------------|--|
| Ray-grass           | 23  |
| Renouée des oiseaux | 1   |

## Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

|   |  |   |   |   |
|---|--|---|---|---|
| <p><b>Date de semis</b></p> <p>Nov-d2</p> <p>Ray-grass 7</p> <p>Renouée des oiseaux 9</p> | <p><b>Étouffement culture</b></p> <p>Association de cultures :<br/>Aucune<br/>Fort</p> <p>Ray-grass -10</p> <p>Renouée des oiseaux -10</p> | <p><b>Interculture</b></p> <p>Date des faux semis :<br/>Date de semis du couvert :<br/>Non définie</p> <p>Date de destruction :<br/>Non définie</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> | <p><b>Date de labour</b></p> <p>Pas de labour</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> | <p><b>Densité de semis</b></p> <p>250 gr/m²</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> |
| <p><b>Entre rangs</b></p> <p>15 cm</p> <p>Ray-grass -1</p> <p>Renouée des oiseaux -1</p>  | <p><b>Variété</b></p> <p>Moyennement couvrante</p> <p>Ray-grass -1</p> <p>Renouée des oiseaux -1</p>                                       | <p><b>Désherbage mécanique</b></p> <p>Bineuse :<br/>Houe rotative :<br/>Herse étrille :</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p>   | <p><b>Désherbage chimique</b></p>   | <p><b>Score annuel</b></p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p>                      |

## Année 2 - Colza d'hiver

|   |   |   |  |   |
|---|---|---|--|---|
| <b>Date de semis</b><br>Sep-d3<br>Ray-grass 80<br>Renouée des oiseaux 0 | <b>Étouffement culture</b><br>Association de cultures :<br>Aucune<br>Fort<br>Ray-grass -10<br>Renouée des oiseaux -10 | <b>Interculture</b><br>Date des faux semis :<br>Date de semis du couvert :<br>Non définie<br>Date de destruction :<br>Non définie<br>Ray-grass 0<br>Renouée des oiseaux 0 | <b>Date de labour</b><br>Pas de labour<br>Ray-grass 0<br>Renouée des oiseaux 0 | <b>Densité de semis</b><br>30 gr/m²<br>Ray-grass 0<br>Renouée des oiseaux 0 |
| <b>Entre rangs</b><br>15 cm<br>Ray-grass -2<br>Renouée des oiseaux -2   | <b>Variété</b><br>Moyennement couvrante<br>Ray-grass -1<br>Renouée des oiseaux -1                                     | <b>Désherbage mécanique</b><br>Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :<br>Ray-grass 0<br>Renouée des oiseaux 0  | <b>Désherbage chimique</b><br>Oct-d3 Oct-d2                                    | <b>Score annuel</b><br>Ray-grass 67<br>Renouée des oiseaux 0                |

## Année 3 - Blé d'hiver

|   |   |   |  |  |
|---|---|---|--|--|
| <b>Date de semis</b><br>Nov-d1<br>Ray-grass 18<br>Renouée des oiseaux 9 | <b>Étouffement culture</b><br>Association de cultures :<br>Aucune<br>Faible<br>Ray-grass -4<br>Renouée des oiseaux -4 | <b>Interculture</b><br>Date des faux semis :<br>Date de semis du couvert :<br>Non définie<br>Date de destruction :<br>Non définie<br>Ray-grass 0<br>Renouée des oiseaux 0 | <b>Date de labour</b><br>Pas de labour<br>Ray-grass 0<br>Renouée des oiseaux 0 | <b>Densité de semis</b><br>230 gr/m²<br>Ray-grass 0<br>Renouée des oiseaux 0 |
| <b>Entre rangs</b><br>15 cm<br>Ray-grass -1<br>Renouée des oiseaux -1   | <b>Variété</b><br>Moyennement couvrante<br>Ray-grass -1<br>Renouée des oiseaux -1                                     | <b>Désherbage mécanique</b><br>Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :<br>Ray-grass 0<br>Renouée des oiseaux 0  | <b>Désherbage chimique</b><br>Aoû-d3   | <b>Score annuel</b><br>Ray-grass 12<br>Renouée des oiseaux 3                 |