

Exploitation : SCEA de l'haezpöel  
 Parcelle : Chapelle  
 Type de sol : Limon - sableux

### Commentaires :

Scénario final

### Adventices étudiées :



## Système de culture

### Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver				
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1 Chénopode 6 Ray-grass 18 Laïteron rude 26	Association de cultures : Aucune Moyen Chénopode -6 Ray-grass -6 Laïteron rude -6	Date des faux semis : Oct-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode -1 Ray-grass -4 Laïteron rude -1	Oct-d3 Chénopode -1 Ray-grass -3 Laïteron rude -1	400 gr/m <sup>2</sup> Chénopode -2 Ray-grass -2 Laïteron rude -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
14 cm Chénopode -1 Ray-grass -1 Laïteron rude -1	Très couvrante Chénopode -2 Ray-grass -2 Laïteron rude -2	Bineuse : Non définie Houe rotative : Non définie Herse étrille : Non définie Chénopode 0 Ray-grass 0 Laïteron rude 0	Nov-d2 Chénopode 0 Ray-grass 0 Laïteron rude 12	Chénopode 0 Ray-grass 0 Laïteron rude 12

## Année 2 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3 Chénopode 57 Ray-grass 12 Laiteron rude 61	Association de cultures : Aucune Fort Chénopode -10 Ray-grass -10 Laiteron rude -10	Date des faux semis : Mar-d3 Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Avr-d2 Chénopode -3 Ray-grass -2 Laiteron rude -2	Mar-d3 Chénopode -1 Ray-grass -2 Laiteron rude -1	4 gr/m <sup>2</sup> Chénopode 0 Ray-grass 0 Laiteron rude 0
Entre rangs 75 cm Chénopode 0 Ray-grass 0 Laiteron rude 0	Variété Non couvrante Chénopode 0 Ray-grass 0 Laiteron rude 0	Désherbage mécanique Bineuse : Non définie Houe rotative : Non définie Herse étrille : Non définie Chénopode 0 Ray-grass 0 Laiteron rude 0	Désherbage chimique Mai-d2	Score annuel Chénopode 43 Ray-grass 0 Laiteron rude 48

## Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2 Chénopode 11 Ray-grass 52 Laiteron rude 29	Association de cultures : Aucune Moyen Chénopode -6 Ray-grass -6 Laiteron rude -6	Date des faux semis : Sep-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode -1 Ray-grass -5 Laiteron rude -1	Oct-d3 Chénopode -1 Ray-grass -3 Laiteron rude -1	400 gr/m <sup>2</sup> Chénopode -2 Ray-grass -2 Laiteron rude -2
Entre rangs 14 cm Chénopode -1 Ray-grass -1 Laiteron rude -1	Variété Très couvrante Chénopode -2 Ray-grass -2 Laiteron rude -2	Désherbage mécanique Bineuse : Non définie Houe rotative : Non définie Herse étrille : Non définie Chénopode 0 Ray-grass 0 Laiteron rude 0	Désherbage chimique Nov-d2	Score annuel Chénopode 0 Ray-grass 33 Laiteron rude 16

## Année 4 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Non définie Mar-d3 Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Avr-d2	Avr-d2	11 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 71	Chénopode -10	Chénopode -3	Chénopode -1	Chénopode 0
Ray-grass 27	Ray-grass -10	Ray-grass -2	Ray-grass -2	Ray-grass 0
Laiteron rude 61	Laiteron rude -10	Laiteron rude -2	Laiteron rude -1	Laiteron rude 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
75 cm	Très couvrante	Bineuse : Jun-d1 Houe rotative : Non définie Herse étrille : Mai-d1 Non définie	Mai-d3	Chénopode 50 Ray-grass 10 Laiteron rude 40
Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -5		
Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass -1		
Laiteron rude 0	Laiteron rude -2	Laiteron rude -6		