

Exploitation : SCEA de l'haezepœl
Parcelle : Chapelle
Type de sol : Limon - sableux

Commentaires :

Scénario final

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Chénopode	43	
Ray-grass	9	
Laiteron rude	52	

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis Nov-d1 Chénopode 6 Ray-grass 18 Laiteron rude 26	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen Chénopode -6 Ray-grass -6 Laiteron rude -6	Interculture Date des faux semis : Oct-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode -1 Ray-grass -4 Laiteron rude -1	Date de labour Oct-d3 Chénopode -1 Ray-grass -3 Laiteron rude -1	Densité de semis 400 gr/m² Chénopode -2 Ray-grass -2 Laiteron rude -2
Entre rangs 14 cm Chénopode -1 Ray-grass -1 Laiteron rude -1	Variété Très couvrante Chénopode -2 Ray-grass -2 Laiteron rude -2	Désherbage mécanique Bineuse : Non définie Houe rotative : Non définie Herse étrille : Non définie Chénopode 0 Ray-grass 0 Laiteron rude 0	Désherbage chimique Nov-d2	Score annuel Chénopode 0 Ray-grass 0 Laiteron rude 12

Année 2 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Mar-d3 Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Avr-d2	Mar-d3	4 gr/m²
Chénopode 57	Chénopode -10	Chénopode -3	Chénopode -1	Chénopode 0
Ray-grass 12	Ray-grass -10	Ray-grass -2	Ray-grass -2	Ray-grass 0
Laiteron rude 61	Laiteron rude -10	Laiteron rude -2	Laiteron rude -1	Laiteron rude 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
75 cm	Non couvrante	Bineuse : Non définie Houe rotative : Non définie Herse étrille : Non définie	Mai-d2	
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 43
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		Laiteron rude 48

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Sep-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d3	400 gr/m²
Chénopode 11	Chénopode -6	Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode -2
Ray-grass 52	Ray-grass -6	Ray-grass -5	Ray-grass -3	Ray-grass -2
Laiteron rude 29	Laiteron rude -6	Laiteron rude -1	Laiteron rude -1	Laiteron rude -2

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
14 cm	Très couvrante	Bineuse : Non définie Houe rotative : Non définie Herse étrille : Non définie	Nov-d2	
Chénopode -1	Chénopode -2	Chénopode 0		Chénopode 0
Ray-grass -1	Ray-grass -2	Ray-grass 0		Ray-grass 33
Laiteron rude -1	Laiteron rude -2	Laiteron rude 0		Laiteron rude 16

Année 4 - Maïs

Date de semis

Avr-d1

Chénopode 71

Ray-grass 27

Laiteron rude 61

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Fort

Chénopode -10

Ray-grass -10

Laiteron rude -10

Interculture

Date des faux semis :

Mar-d3

Non définie

Date de semis du couvert :

Aoû-d2

Date de destruction :

Avr-d2

Chénopode -3

Ray-grass -2

Laiteron rude -2

Date de labour

Avr-d2

Chénopode -1

Ray-grass -2

Laiteron rude -1

Densité de semis

11 gr/m²

Chénopode 0

Ray-grass 0

Laiteron rude 0

Entre rangs

75 cm

Chénopode 0

Ray-grass 0

Laiteron rude 0

Variété

Très couvrante

Chénopode -2

Ray-grass -2

Laiteron rude -2

Désherbage mécanique

Bineuse :

Jun-d1

Houe rotative :

Non définie

Herse étrille :

Non définie

Mai-d1

Chénopode -5

Ray-grass -1

Laiteron rude -6

Désherbage chimique

Mai-d3

Score annuel

Chénopode 50

Ray-grass 10

Laiteron rude 40