

Exploitation : lulu
Parcelle : mon de ham
Type de sol : craie

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	40	
Chénopode	40	
Folle-avoine	28	

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Orge d'hiver

Date de semis Oct-d1 Vulpin 83 Chénopode 9 Folle-avoine 21	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen Vulpin -6 Chénopode -6 Folle-avoine -6	Interculture Date des faux semis : Non définie Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin 0 Chénopode 0 Folle-avoine 0	Date de labour Pas de labour Vulpin 0 Chénopode 0 Folle-avoine 0	Densité de semis 330 gr/m² Vulpin 0 Chénopode 0 Folle-avoine 0
Entre rangs 15 cm Vulpin -1 Chénopode -1 Folle-avoine -1	Variété Moyennement couvrante Vulpin -1 Chénopode -1 Folle-avoine -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Chénopode 0 Folle-avoine 0	Désherbage chimique Oct-d3	Score annuel Vulpin 75 Chénopode 1 Folle-avoine 13

Année 2 - Betteraves

Date de semis <div>Avr-d1</div> <div>Vulpin 28</div> <div>Chénopode 66</div> <div>Folle-avoine 69</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen <div>Vulpin -6</div> <div>Chénopode -6</div> <div>Folle-avoine -6</div>	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Aoû-d2</div> Date de destruction : <div>Nov-d1</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	Date de labour <div>Nov-d1</div> <div>Vulpin -5</div> <div>Chénopode -1</div> <div>Folle-avoine -4</div>	Densité de semis 13 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>
Entre rangs 45 cm <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	Variété Moyennement couvrante <div>Vulpin -1</div> <div>Chénopode -1</div> <div>Folle-avoine -1</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	Désherbage chimique <div>Avr-d3</div>	Score annuel <div>Vulpin 16</div> <div>Chénopode 57</div> <div>Folle-avoine 58</div>

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Oct-d2</div> <div>Vulpin 60</div> <div>Chénopode 11</div> <div>Folle-avoine 26</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen <div>Vulpin -6</div> <div>Chénopode -6</div> <div>Folle-avoine -6</div>	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	Densité de semis 350 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>
Entre rangs 15 cm <div>Vulpin -1</div> <div>Chénopode -1</div> <div>Folle-avoine -1</div>	Variété Moyennement couvrante <div>Vulpin -1</div> <div>Chénopode -1</div> <div>Folle-avoine -1</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	Désherbage chimique <div>Oct-d3</div>	Score annuel <div>Vulpin 52</div> <div>Chénopode 3</div> <div>Folle-avoine 18</div>