

Exploitation : lulu
Parcelle : mon de ha
Type de sol : craie

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	7	
Chénopode	36	
Folle-avoine	16	

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Orge d'hiver

Date de semis Oct-d3 Vulpin 31 Chénopode 2 Folle-avoine 7	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen Vulpin -6 Chénopode -6 Folle-avoine -6	Interculture Date des faux semis : Sep-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin -5 Chénopode -2 Folle-avoine -2	Date de labour Sep-d2 Vulpin -8 Chénopode -2 Folle-avoine -5	Densité de semis 370 gr/m² Vulpin -2 Chénopode -2 Folle-avoine -2
Entre rangs 15 cm Vulpin -1 Chénopode -1 Folle-avoine -1	Variété Moyennement couvrante Vulpin -1 Chénopode -1 Folle-avoine -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Chénopode 0 Folle-avoine 0	Désherbage chimique Nov-d1	Score annuel Vulpin 9 Chénopode 0 Folle-avoine 0

Année 2 - Betteraves

Date de semis <div>Avr-d1</div> <div>Vulpin 28</div> <div>Chénopode 66</div> <div>Folle-avoine 69</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen <div>Vulpin -6</div> <div>Chénopode -6</div> <div>Folle-avoine -6</div>	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Aoû-d2</div> Date de destruction : <div>Nov-d1</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	Date de labour <div>Nov-d1</div> <div>Vulpin -5</div> <div>Chénopode -1</div> <div>Folle-avoine -4</div>	Densité de semis 13 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>
Entre rangs 45 cm <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	Variété Non couvrante <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : <div>Jun-d1</div> <div>Mai-d3</div> Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode -4</div> <div>Folle-avoine -2</div>	Désherbage chimique <div>Avr-d3</div>	Score annuel <div>Vulpin 17</div> <div>Chénopode 54</div> <div>Folle-avoine 57</div>

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Nov-d1</div> <div>Vulpin 14</div> <div>Chénopode 6</div> <div>Folle-avoine 15</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen <div>Vulpin -6</div> <div>Chénopode -6</div> <div>Folle-avoine -6</div>	Interculture Date des faux semis : <div>Non définie</div> Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	Date de labour <div>Oct-d3</div> <div>Vulpin -7</div> <div>Chénopode -1</div> <div>Folle-avoine -4</div>	Densité de semis 400 gr/m² <div>Vulpin -2</div> <div>Chénopode -2</div> <div>Folle-avoine -2</div>
Entre rangs 15 cm <div>Vulpin -1</div> <div>Chénopode -1</div> <div>Folle-avoine -1</div>	Variété Non couvrante <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	Désherbage chimique <div>Nov-d1</div>	Score annuel <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Folle-avoine 2</div>