

Exploitation : EARL Gaessler  
 Parcelle : 2  
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

  


## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	18
Ray-grass	18
Paturin	57

## Système de culture

### Situation initiale :

Année 1 - Maïs					
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
Mai-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Mar-d1	900 gr/m <sup>2</sup>	
Vulpin 9	Vulpin -4 Ray-grass -4 Paturin -4	Vulpin 0 Ray-grass 0 Paturin 0	Vulpin -3 Ray-grass -2 Paturin -1	Vulpin 0 Ray-grass 0 Paturin 0	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
10 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Mai-d1 Herse étrille : Vulpin -1 Ray-grass -1 Paturin -2	Nov-d2 Sep-d2 Jul-d2 Mai-d2	Vulpin 0 Ray-grass 0 Paturin 39	
Vulpin -2 Ray-grass -2 Paturin -2	Vulpin -1 Ray-grass -1 Paturin -1	Vulpin -1 Ray-grass -1 Paturin -2			

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2 Vulpin 60 Ray-grass 52 Paturin 22	Association de cultures : Aucune Faible Vulpin -4 Ray-grass -4 Paturin -4	Date des faux semis : Non définie Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin 0 Ray-grass 0 Paturin 0	Sep-d2 Vulpin -4 Ray-grass -3 Paturin -1	400 gr/m <sup>2</sup> Vulpin -2 Ray-grass -2 Paturin -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
5 cm Vulpin -2 Ray-grass -2 Paturin -2	Moyennement couvrante Vulpin -1 Ray-grass -1 Paturin -1	Bineuse : Houe rotative : Nov-d2 Herse étrille : Vulpin -1 Ray-grass -1 Paturin -1	Déc-d2 Nov-d2 Avr-d3 Fév-d3 Dés -1	Vulpin 46 Ray-grass 39 Paturin 11