

Exploitation : GAEC Prahas
Parcelle : Ulysse
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	26	
Chénopode	44	
Amarante réfléchie	23	

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Aoû-d2 Sep-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	280 gr/m²
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass -8	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Chénopode 6	Chénopode -4	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -4	Amarante réfléchie -5	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1 Oct-d1 Mar-d1	
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 3
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 0
Amarante réfléchie -2	Amarante réfléchie -1	Amarante réfléchie 0		Amarante réfléchie 0

Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis Aoû-d2 Ray-grass 88 Chénopode 34 Amarante réfléchie 41	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen Ray-grass -6 Chénopode -6 Amarante réfléchie -6	Interculture Date des faux semis : Jul-d3 Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass -3 Chénopode -3 Amarante réfléchie -8	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0 Chénopode 0 Amarante réfléchie 0	Densité de semis 50 gr/m² Ray-grass 0 Chénopode 0 Amarante réfléchie 0
Entre rangs 12 cm Ray-grass -2 Chénopode -2 Amarante réfléchie -2	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Chénopode 0 Amarante réfléchie 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Chénopode 0 Amarante réfléchie 0	Désherbage chimique Déc-d3	Score annuel Ray-grass 78 Chénopode 22 Amarante réfléchie 25

Année 3 - Maïs

Date de semis Avr-d3 Ray-grass 12 Chénopode 62 Amarante réfléchie 52	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Ray-grass 0 Chénopode 0 Amarante réfléchie 0	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d2 Aoû-d1 Date de destruction : Ray-grass 0 Chénopode 0 Amarante réfléchie 0	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0 Chénopode 0 Amarante réfléchie 0	Densité de semis 115 gr/m² Ray-grass 0 Chénopode 0 Amarante réfléchie 0
Entre rangs 60 cm Ray-grass -2 Chénopode -2 Amarante réfléchie -2	Variété Moyennement couvrante Ray-grass -1 Chénopode -1 Amarante réfléchie -1	Désherbage mécanique Bineuse : Jul-d2 Mai-d3 Mai-d1 Houe rotative : Mai-d1 Herse étrille : Ray-grass -1 Chénopode -8 Amarante réfléchie -4	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 8 Chénopode 51 Amarante réfléchie 45