

Exploitation : SCEA du petit bas champ
Parcelle : petit bas champ
Type de sol : argilo-sableux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	5	
Renouée liseron	55	
Vulpin	4	

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Maïs

<p>Date de semis</p> <p>Avr-d1</p> <p>Ray-grass 27</p> <p>Renouée liseron 119</p> <p>Vulpin 28</p>	<p>Étouffement culture</p> <p>Association de cultures : Aucune Très faible</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>Interculture</p> <p>Date des faux semis : Avr-d1</p> <p>Date de semis du couvert : Sep-d1</p> <p>Date de destruction : Mar-d1</p> <p>Ray-grass -2</p> <p>Renouée liseron -3</p> <p>Vulpin -2</p>	<p>Date de labour</p> <p>Fév-d1</p> <p>Ray-grass -2</p> <p>Renouée liseron -2</p> <p>Vulpin -2</p>	<p>Densité de semis</p> <p>300 gr/m²</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Vulpin 0</p>
<p>Entre rangs</p> <p>75 cm</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>Variété</p> <p>Moyennement couvrante</p> <p>Ray-grass -1</p> <p>Renouée liseron -1</p> <p>Vulpin -1</p>	<p>Désherbage mécanique</p> <p>Bineuse : Non définie</p> <p>Houe rotative : Avr-d1</p> <p>Herse étrille : Non définie Avr-d1</p> <p>Ray-grass -4</p> <p>Renouée liseron -6</p> <p>Vulpin -4</p>	<p>Désherbage chimique</p>	<p>Score annuel</p> <p>Ray-grass 19</p> <p>Renouée liseron 108</p> <p>Vulpin 19</p>

Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Avr-d2 Date de semis du couvert : Sep-d2 Date de destruction : Mar-d2	Oct-d2	250 gr/m²
Ray-grass 4	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -5	Renouée liseron -2	Renouée liseron 0
Vulpin 6	Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin -4	Vulpin 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Non définie Houe rotative : Avr-d2 Herse étrille : Sep-d2 Non définie		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Avr-d3 Date de semis du couvert : Sep-d3 Date de destruction : Mar-d3	Fév-d3	300 gr/m²
Ray-grass 12	Ray-grass -10	Ray-grass -1	Ray-grass -2	Ray-grass 0
Renouée liseron 133	Renouée liseron -10	Renouée liseron -6	Renouée liseron -2	Renouée liseron 0
Vulpin 15	Vulpin -10	Vulpin -1	Vulpin -2	Vulpin 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
75 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Non définie Houe rotative : Avr-d3 Herse étrille : Avr-d3		
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass -3		Ray-grass 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -1	Renouée liseron -12		Renouée liseron 102
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin -3		Vulpin 0