

Exploitation : ferme des sansonnets
 Parcelle : 1
 Type de sol : limoneux


Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : |
|--------------|----------|
| Ray-grass | 35 |
| Vulpin | 35 |

Système de culture

Situation initiale :



Année 2 - Lin de printemps

| | | | | |
|---------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------|
| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
| Mar-d2 | Association de cultures : Aucune Très faible | Date des faux semis : Jun-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie | Fév-d3 | Non défini |
| Ray-grass 35 Vulpin 38 | Ray-grass 0 Vulpin 0 | Ray-grass 0 Vulpin 0 | Ray-grass -2 Vulpin -2 | Ray-grass 0 Vulpin 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| Non défini | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0 | | Ray-grass 33 Vulpin 36 |
| Ray-grass 0 Vulpin 0 | Ray-grass 0 Vulpin 0 | Ray-grass 0 Vulpin 0 | | |

Année 3 - Blé d'hiver

| | | | | |
|---------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------|
| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
| Oct-d2 | Association de cultures : Aucune Faible | Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie | Sep-d3 | Non défini |
| Ray-grass 52 Vulpin 60 | Ray-grass -4 Vulpin -4 | Ray-grass 0 Vulpin 0 | Ray-grass -3 Vulpin -4 | Ray-grass 0 Vulpin 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| Non défini | Moyennement couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0 | | Ray-grass 44 Vulpin 51 |
| Ray-grass 0 Vulpin 0 | Ray-grass -1 Vulpin -1 | Ray-grass 0 Vulpin 0 | | |

Année 4 - Betteraves

| | | | | |
|---------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------|
| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
| Mar-d1 | Association de cultures : Aucune Très faible | Date des faux semis : Sep-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie | Fév-d3 | Non défini |
| Ray-grass 33 Vulpin 36 | Ray-grass 0 Vulpin 0 | Ray-grass -5 Vulpin -6 | Ray-grass -2 Vulpin -2 | Ray-grass 0 Vulpin 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| Non défini | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0 | | Ray-grass 27 Vulpin 28 |
| Ray-grass 0 Vulpin 0 | Ray-grass 0 Vulpin 0 | Ray-grass 0 Vulpin 0 | | |

Année 5 - Colza de printemps

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-------------------------|--|--|---------------------------|---------------------------|
| Mar-d2 | Association de cultures : Aucune Très faible | Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie | Fév-d3 | Non défini |
| Ray-grass 35 | Ray-grass 0 Vulpin 0 | Ray-grass 0 Vulpin 0 | Ray-grass -2 Vulpin -2 | Ray-grass 0 Vulpin 0 |
| Vulpin 38 | | | | |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| Non défini | Moyennement couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0 | | Ray-grass 32 Vulpin 35 |
| Ray-grass 0 Vulpin 0 | Ray-grass -1 Vulpin -1 | | | |