

Scénario : 2
 Exploitation : Non renseigné
 Parcelle : Plateforme désherbage
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	25 (27)

Scénario :**Année 1 - Betteraves**

Date de semis Mar-d2 Ray-grass 35	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Ray-grass 0	Interculture Aoû-d3 50% Ray-grass -4	Date de labour Nov-d2 Ray-grass -4	Densité de semis 12 gr/m ² Ray-grass 0
Entre rangs 42 cm Ray-grass 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 27

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis Nov-d1 Ray-grass 18	Étouffement culture Association de cultures : Faible Ray-grass -4	Interculture Ray-grass 0	Date de labour Nov-d1 Ray-grass -4	Densité de semis 240 gr/m ² Ray-grass 0
Entre rangs 15 cm Ray-grass -1	Variété Non couvrante Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d3 Ray-grass 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 9

Année 3 - Pois de printemps

Date de semis Mar-d1 Ray-grass 33	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Ray-grass 0	Interculture Sep-d1 50% Aoû-d2 50% Ray-grass -8	Date de labour Mar-d1 Ray-grass -4	Densité de semis 12 gr/m ² Ray-grass 0
Entre rangs 42 cm Ray-grass 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 22

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d1 Ray-grass 69	Étouffement culture Association de cultures : Faible Ray-grass -4	Interculture Sep-d3 50% Aoû-d2 50% Ray-grass -8	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0	Densité de semis 180 gr/m ² Ray-grass 0
Entre rangs 15 cm Ray-grass -1	Variété Non couvrante Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Oct-d3 Oct-d2 Ray-grass -7	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 49