

Scénario : 7
Exploitation : Non renseigné
Parcelle : Plateforme désherbage
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	21 (27) 

Scénario :

Année 1 - Betteraves

Date de semis Mar-d2 Ray-grass 35	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Ray-grass 0	Interculture Aoû-d3 50% Ray-grass -4	Date de labour Nov-d2 Ray-grass -2	Densité de semis 12 gr/m² Ray-grass 0
Entre rangs 42 cm Ray-grass 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 29

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis Nov-d1 Ray-grass 18	Étouffement culture Association de cultures : Faible Ray-grass -4	Interculture Ray-grass 0	Date de labour Nov-d1 Ray-grass -2	Densité de semis 240 gr/m² Ray-grass 0
Entre rangs 15 cm Ray-grass -1	Variété Non couvrante Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d3 Ray-grass 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 11

Année 3 - Pois de printemps

Date de semis Mar-d1 Ray-grass 33	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Ray-grass 0	Interculture Aoû-d2 50% Sep-d1 50% Ray-grass -8	Date de labour Mar-d1 Ray-grass -2	Densité de semis 12 gr/m² Ray-grass 0
Entre rangs 42 cm Ray-grass 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 24

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis

Oct-d3

Ray-grass 35

Étouffement culture

Association de cultures :
Faible

Ray-grass -4

Interculture

Aoû-d2 50%

Ray-grass -3

Date de labour

Sep-d3

Ray-grass -3

Densité de semis

180 gr/m²

Ray-grass 0

Entre rangs

15 cm

Ray-grass -1

Variété

Non couvrante

Ray-grass 0

Désherbage mécanique

Bineuse :

Houe rotative :

Herse étrille :

Oct-d3

Mar-d3

Ray-grass -3

Désherbage chimique

Score annuel

Ray-grass 20