

Scénario : 8
 Exploitation : Non renseigné
 Parcelle : Plateforme désherbage
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	19 (27)



Scénario :

Année 1 - Betteraves

Date de semis Mar-d2 Ray-grass 35	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Ray-grass 0	Interculture Aoû-d3 50% Ray-grass -4	Date de labour Nov-d2 Ray-grass -2	Densité de semis 12 gr/m ² Ray-grass 0
Entre rangs 42 cm Ray-grass 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 29

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis Nov-d1 Ray-grass 18	Étouffement culture Association de cultures : Faible Ray-grass -4	Interculture Ray-grass 0	Date de labour Nov-d1 Ray-grass -2	Densité de semis 240 gr/m ² Ray-grass 0
Entre rangs 15 cm Ray-grass -1	Variété Non couvrante Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d3 Ray-grass 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 11

Année 3 - Pois de printemps

Date de semis Mar-d1 Ray-grass 33	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Ray-grass 0	Interculture Sep-d1 50% Aoû-d2 50% Ray-grass -8	Date de labour Mar-d1 Ray-grass -2	Densité de semis 12 gr/m ² Ray-grass 0
Entre rangs 42 cm Ray-grass 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 24

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50% Aoû-d2 50%	Sep-d3	180 gr/m ²
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -7	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d3 Oct-d3		Ray-grass 17
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass -3		