

Scénario : 1
Exploitation : bonneuil
Parcelle : mimi
Type de sol : limon argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Chénopode	47 (49)	
Renouée liseron	23 (24)	
Datura stramoine	29 (30)	
Renouée persicaire	37 (39)	
Sanve	46 (47)	

Scénario :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Mar-d2</p> <p>Chénopode 64</p> <p>Renouée liseron 58</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Renouée persicaire 60</p> <p>Sanve 79</p>	<p>Association de cultures : Faible</p> <p>Chénopode -4</p> <p>Renouée liseron -4</p> <p>Datura stramoine -4</p> <p>Renouée persicaire -4</p> <p>Sanve -4</p>	<p>Août-d3 50%</p> <p>Chénopode -2</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Datura stramoine -2</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Sanve -1</p>	<p>Nov-d1</p> <p>Chénopode -1</p> <p>Renouée liseron -3</p> <p>Datura stramoine -2</p> <p>Renouée persicaire -2</p> <p>Sanve -2</p>	<p>12 gr/m²</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Sanve 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>42 cm</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Sanve 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Sanve 0</p>	<p>Bineuse : Mai-d2 Mai-d1</p> <p>Houe rotative :</p> <p>Herse étrille :</p> <p>Chénopode -6</p> <p>Renouée liseron -14</p> <p>Datura stramoine -2</p> <p>Renouée persicaire -13</p> <p>Sanve -4</p>	<p>Avr-d1</p>	<p>Chénopode 52</p> <p>Renouée liseron 37</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Renouée persicaire 40</p> <p>Sanve 69</p>

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible		Nov-d1	220 gr/m²
Chénopode 6	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Datura stramoine 0	Datura stramoine -4	Datura stramoine 0	Datura stramoine -2	Datura stramoine 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0
Sanve 19	Sanve -4	Sanve 0	Sanve -2	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d1	Chénopode 0
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron -2	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		Datura stramoine 0
Datura stramoine -2	Datura stramoine -1	Datura stramoine 0		Renouée persicaire 0
Renouée persicaire -2	Renouée persicaire -1	Renouée persicaire 0		Sanve 10
Sanve -2	Sanve -1	Sanve 0		

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Faible	Août-d2 50%	Déc-d1	12 gr/m²
Chénopode 66	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0
Renouée liseron 108	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Datura stramoine 8	Datura stramoine -4	Datura stramoine -3	Datura stramoine -2	Datura stramoine 0
Renouée persicaire 116	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0
Sanve 65	Sanve -4	Sanve -1	Sanve -2	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d1	Chénopode 59
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Renouée liseron 101
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Datura stramoine 0
Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0		Renouée persicaire 109
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Sanve 59
Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Oct-d2</div> <div>Chénopode 11</div> <div>Renouée liseron 1</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Sanve 21</div>	Étouffement culture Association de cultures : Faible <div>Chénopode -4</div> <div>Renouée liseron -4</div> <div>Datura stramoine -4</div> <div>Renouée persicaire -4</div> <div>Sanve -4</div>	Interculture <div>Sep-d2 50%</div> <div>Chénopode -2</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Datura stramoine -1</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Sanve -1</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Sanve 0</div>	Densité de semis 180 gr/m² <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Sanve 0</div>
Entre rangs 12 cm <div>Chénopode -2</div> <div>Renouée liseron -2</div> <div>Datura stramoine -2</div> <div>Renouée persicaire -2</div> <div>Sanve -2</div>	Variété Moyennement couvrante <div>Chénopode -1</div> <div>Renouée liseron -1</div> <div>Datura stramoine -1</div> <div>Renouée persicaire -1</div> <div>Sanve -1</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Sanve 0</div>	Désherbage chimique <div>Mar-d2</div>	Score annuel <div>Chénopode 2</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Sanve 13</div>

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Jun-d1</div> <div>Chénopode 38</div> <div>Renouée liseron 63</div> <div>Datura stramoine 113</div> <div>Renouée persicaire 57</div> <div>Sanve 24</div>	Étouffement culture Association de cultures : Faible <div>Chénopode -4</div> <div>Renouée liseron -4</div> <div>Datura stramoine -4</div> <div>Renouée persicaire -4</div> <div>Sanve -4</div>	Interculture <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Sanve 0</div>	Date de labour <div>Déc-d2</div> <div>Chénopode -1</div> <div>Renouée liseron -3</div> <div>Datura stramoine -2</div> <div>Renouée persicaire -2</div> <div>Sanve -2</div>	Densité de semis 12 gr/m² <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Sanve 0</div>
Entre rangs 42 cm <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Sanve 0</div>	Variété Non couvrante <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Sanve 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : <div>Aoû-d1 Jul-d2</div> Houe rotative : Herse étrille : <div>Chénopode -3</div> <div>Renouée liseron -1</div> <div>Datura stramoine -9</div> <div>Renouée persicaire -2</div> <div>Sanve -2</div>	Désherbage chimique <div>Aoû-d1 Jul-d2</div>	Score annuel <div>Chénopode 29</div> <div>Renouée liseron 56</div> <div>Datura stramoine 99</div> <div>Renouée persicaire 49</div> <div>Sanve 17</div>

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Oct-d2</div> <div>Chénopode 11</div> <div>Renouée liseron 1</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Sanve 21</div>	Étouffement culture Association de cultures : Faible <div>Chénopode -4</div> <div>Renouée liseron -4</div> <div>Datura stramoine -4</div> <div>Renouée persicaire -4</div> <div>Sanve -4</div>	Interculture <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Sanve 0</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Sanve 0</div>	Densité de semis 180 gr/m² <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Sanve 0</div>
Entre rangs 12 cm <div>Chénopode -2</div> <div>Renouée liseron -2</div> <div>Datura stramoine -2</div> <div>Renouée persicaire -2</div> <div>Sanve -2</div>	Variété Très couvrante <div>Chénopode -2</div> <div>Renouée liseron -2</div> <div>Datura stramoine -2</div> <div>Renouée persicaire -2</div> <div>Sanve -2</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Sanve 0</div>	Désherbage chimique <div>Mar-d1</div>	Score annuel <div>Chénopode 3</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Sanve 13</div>

Année 7 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Sep-d1</div> <div>Chénopode 33</div> <div>Renouée liseron 1</div> <div>Datura stramoine 20</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Sanve 25</div>	Étouffement culture Association de cultures : Faible <div>Chénopode -4</div> <div>Renouée liseron -4</div> <div>Datura stramoine -4</div> <div>Renouée persicaire -4</div> <div>Sanve -4</div>	Interculture <div>Août-d2 50% Sep-d1 50%</div> <div>Chénopode -3</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Datura stramoine -5</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Sanve -2</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Sanve 0</div>	Densité de semis 12 gr/m² <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Sanve 0</div>
Entre rangs 25 cm <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Sanve 0</div>	Variété Non couvrante <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Sanve 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Sanve 0</div>	Désherbage chimique <div>Sep-d2</div>	Score annuel <div>Chénopode 25</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Datura stramoine 11</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Sanve 20</div>

Année 8 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Sep-d1 50% Aoû-d2 50%	Pas de labour	160 gr/m ²
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Datura stramoine 0	Datura stramoine -4	Datura stramoine -5	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Sanve 21	Sanve -4	Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2	
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 1
Renouée liseron -2	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Datura stramoine -2	Datura stramoine -1	Datura stramoine 0		Datura stramoine 0
Renouée persicaire -2	Renouée persicaire -1	Renouée persicaire 0		Renouée persicaire 0
Sanve -2	Sanve -1	Sanve 0		Sanve 12