

Exploitation : haricot
 Parcelle : pi-haricot
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Chénopode hybride	77	
Matricaire	78	
Carotte sauvage	51	
Séneçon vulgaire	48	
Ammi élevé	83	

Situation initiale :

Année 1 - Autre culture de printemps.

Date de semis Mar-d1 Chénopode hybride 73 Matricaire 48 Carotte sauvage 34 Séneçon vulgaire 33 Ammi élevé 55	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Chénopode hybride 0 Matricaire 0 Carotte sauvage 0 Séneçon vulgaire 0 Ammi élevé 0	Interculture Chénopode hybride 0 Matricaire 0 Carotte sauvage 0 Séneçon vulgaire 0 Ammi élevé 0	Date de labour Nov-d3 Chénopode hybride -2 Matricaire -2 Carotte sauvage -2 Séneçon vulgaire -4 Ammi élevé -1	Densité de semis 12 gr/m² Chénopode hybride 0 Matricaire 0 Carotte sauvage 0 Séneçon vulgaire 0 Ammi élevé 0
Entre rangs 42 cm Chénopode hybride 0 Matricaire 0 Carotte sauvage 0 Séneçon vulgaire 0 Ammi élevé 0	Variété Non couvrante Chénopode hybride 0 Matricaire 0 Carotte sauvage 0 Séneçon vulgaire 0 Ammi élevé 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode hybride 0 Matricaire 0 Carotte sauvage 0 Séneçon vulgaire 0 Ammi élevé 0	Désherbage chimique	Score annuel Chénopode hybride 71 Matricaire 46 Carotte sauvage 32 Séneçon vulgaire 29 Ammi élevé 53

Année 2 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Oct-d2 50% Nov-d1 50%	Nov-d2	12 gr/m ²
Chénopode hybride 83	Chénopode hybride 0	Chénopode hybride 0	Chénopode hybride -2	Chénopode hybride 0
Matricaire 47	Matricaire 0	Matricaire -2	Matricaire -2	Matricaire 0
Carotte sauvage 48	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage -3	Carotte sauvage -2	Carotte sauvage 0
Séneçon vulgaire 45	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -4	Séneçon vulgaire -4	Séneçon vulgaire 0
Ammi élevé 60	Ammi élevé 0	Ammi élevé -3	Ammi élevé -2	Ammi élevé 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode hybride 82
Chénopode hybride 0	Chénopode hybride 0	Chénopode hybride 0		Matricaire 43
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Carotte sauvage 43
Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0		Séneçon vulgaire 38
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0		Ammi élevé 55
Ammi élevé 0	Ammi élevé 0	Ammi élevé 0		

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50%	Pas de labour	230 gr/m ²
Chénopode hybride 8	Chénopode hybride -4	Chénopode hybride 0	Chénopode hybride 0	Chénopode hybride 0
Matricaire 26	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Carotte sauvage 25	Carotte sauvage -4	Carotte sauvage -2	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0
Séneçon vulgaire 41	Séneçon vulgaire -4	Séneçon vulgaire -2	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0
Ammi élevé 39	Ammi élevé -4	Ammi élevé -1	Ammi élevé 0	Ammi élevé 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Mar-d1 Fév-d3 Herse étrille :	Mai-d2	Chénopode hybride 0
Chénopode hybride -1	Chénopode hybride 0	Chénopode hybride -4		Matricaire 16
Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire -4		Carotte sauvage 16
Carotte sauvage -1	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage -2		Séneçon vulgaire 33
Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -2		Ammi élevé 30
Ammi élevé -1	Ammi élevé 0	Ammi élevé -3		

Année 4 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d2	Association de cultures : Fort	Aoû-d2 50% Sep-d1 50% Aoû-d1 50%	Nov-d3	200 gr/m ²
Chénopode hybride 46	Chénopode hybride -10	Chénopode hybride -2	Chénopode hybride -2	Chénopode hybride 0
Matricaire 42	Matricaire -10	Matricaire -4	Matricaire -2	Matricaire 0
Carotte sauvage 21	Carotte sauvage -10	Carotte sauvage -3	Carotte sauvage -2	Carotte sauvage 0
Séneçon vulgaire 21	Séneçon vulgaire -10	Séneçon vulgaire -3	Séneçon vulgaire -4	Séneçon vulgaire 0
Ammi élevé 36	Ammi élevé -10	Ammi élevé -2	Ammi élevé -1	Ammi élevé 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Avr-d3 Avr-d2 Herse étrille :		Chénopode hybride 32
Chénopode hybride -1	Chénopode hybride 0	Chénopode hybride 0		Matricaire 25
Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0		Carotte sauvage 5
Carotte sauvage -1	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0		Séneçon vulgaire 4
Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0		Ammi élevé 21
Ammi élevé -1	Ammi élevé 0	Ammi élevé 0		

Année 5 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d1 50% Aoû-d2 50%	Nov-d3	12 gr/m ²
Chénopode hybride 81	Chénopode hybride 0	Chénopode hybride -2	Chénopode hybride -2	Chénopode hybride 0
Matricaire 48	Matricaire 0	Matricaire -3	Matricaire -2	Matricaire 0
Carotte sauvage 41	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage -2	Carotte sauvage -2	Carotte sauvage 0
Séneçon vulgaire 40	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -2	Séneçon vulgaire -4	Séneçon vulgaire 0
Ammi élevé 60	Ammi élevé 0	Ammi élevé -1	Ammi élevé -1	Ammi élevé 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d2 Jun-d1 Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d3	Chénopode hybride 71
Chénopode hybride 0	Chénopode hybride 0	Chénopode hybride -6		Matricaire 41
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -3		Carotte sauvage 32
Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage -5		Séneçon vulgaire 30
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -4		Ammi élevé 54
Ammi élevé 0	Ammi élevé 0	Ammi élevé -3		