

Scénario : 2
Exploitation : haricot
Parcelle : pi-haricot
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : | |
|-------------------|-----------|--|
| Chénopode hybride | 78 (77) | |
| Matricaire | 78 (78) | |
| Carotte sauvage | 51 (51) | |
| Séneçon vulgaire | 49 (48) | |
| Ammi élevé | 83 (83) | |

Scénario :

Année 1 - Autre culture de print.

| | | | | |
|--|---|---|---|--|
| Date de semis <div>Mar-d1</div> <div>Chénopode hybride 73</div> <div>Matricaire 48</div> <div>Carotte sauvage 34</div> <div>Séneçon vulgaire 33</div> <div>Ammi élevé 55</div> | Étouffement culture Association de cultures : Très faible <div>Chénopode hybride 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Carotte sauvage 0</div> <div>Séneçon vulgaire 0</div> <div>Ammi élevé 0</div> | Interculture <div>Chénopode hybride 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Carotte sauvage 0</div> <div>Séneçon vulgaire 0</div> <div>Ammi élevé 0</div> | Date de labour <div>Nov-d3</div> <div>Chénopode hybride -2</div> <div>Matricaire -2</div> <div>Carotte sauvage -2</div> <div>Séneçon vulgaire -4</div> <div>Ammi élevé -1</div> | Densité de semis 12 gr/m² <div>Chénopode hybride 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Carotte sauvage 0</div> <div>Séneçon vulgaire 0</div> <div>Ammi élevé 0</div> |
| Entre rangs 42 cm <div>Chénopode hybride 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Carotte sauvage 0</div> <div>Séneçon vulgaire 0</div> <div>Ammi élevé 0</div> | Variété Non couvrante <div>Chénopode hybride 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Carotte sauvage 0</div> <div>Séneçon vulgaire 0</div> <div>Ammi élevé 0</div> | Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Chénopode hybride 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Carotte sauvage 0</div> <div>Séneçon vulgaire 0</div> <div>Ammi élevé 0</div> | Désherbage chimique | Score annuel <div>Chénopode hybride 71</div> <div>Matricaire 46</div> <div>Carotte sauvage 32</div> <div>Séneçon vulgaire 29</div> <div>Ammi élevé 53</div> |

Année 2 - Pomme de terre

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-------------------------|---------------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| Mar-d3 | Association de cultures : Très faible | Oct-d2 50% Nov-d1 50% | Nov-d2 | 12 gr/m² |
| Chénopode hybride 83 | Chénopode hybride 0 | Chénopode hybride 0 | Chénopode hybride -2 | Chénopode hybride 0 |
| Matricaire 47 | Matricaire 0 | Matricaire -2 | Matricaire -2 | Matricaire 0 |
| Carotte sauvage 48 | Carotte sauvage 0 | Carotte sauvage -3 | Carotte sauvage -2 | Carotte sauvage 0 |
| Séneçon vulgaire 45 | Séneçon vulgaire 0 | Séneçon vulgaire -4 | Séneçon vulgaire -4 | Séneçon vulgaire 0 |
| Ammi élevé 60 | Ammi élevé 0 | Ammi élevé -3 | Ammi élevé -2 | Ammi élevé 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | Chénopode hybride 82 |
| Chénopode hybride 0 | Chénopode hybride 0 | Chénopode hybride 0 | | Matricaire 43 |
| Matricaire 0 | Matricaire 0 | Matricaire 0 | | Carotte sauvage 43 |
| Carotte sauvage 0 | Carotte sauvage 0 | Carotte sauvage 0 | | Séneçon vulgaire 38 |
| Séneçon vulgaire 0 | Séneçon vulgaire 0 | Séneçon vulgaire 0 | | Ammi élevé 55 |
| Ammi élevé 0 | Ammi élevé 0 | Ammi élevé 0 | | |

Année 3 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-------------------------|----------------------------------|---|-------------------------|------------------------|
| Oct-d3 | Association de cultures : Faible | Oct-d1 50% | Oct-d2 | 230 gr/m² |
| Chénopode hybride 8 | Chénopode hybride -4 | Chénopode hybride 0 | Chénopode hybride -2 | Chénopode hybride 0 |
| Matricaire 26 | Matricaire -4 | Matricaire -1 | Matricaire -2 | Matricaire 0 |
| Carotte sauvage 25 | Carotte sauvage -4 | Carotte sauvage -2 | Carotte sauvage -3 | Carotte sauvage 0 |
| Séneçon vulgaire 41 | Séneçon vulgaire -4 | Séneçon vulgaire -2 | Séneçon vulgaire -4 | Séneçon vulgaire 0 |
| Ammi élevé 39 | Ammi élevé -4 | Ammi élevé -1 | Ammi élevé -2 | Ammi élevé 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 15 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Mai-d2 | Chénopode hybride 0 |
| Chénopode hybride -1 | Chénopode hybride 0 | Chénopode hybride -4 | | Matricaire 14 |
| Matricaire -1 | Matricaire 0 | Matricaire -4 | | Carotte sauvage 13 |
| Carotte sauvage -1 | Carotte sauvage 0 | Carotte sauvage -2 | | Séneçon vulgaire 29 |
| Séneçon vulgaire -1 | Séneçon vulgaire 0 | Séneçon vulgaire -2 | | Ammi élevé 28 |
| Ammi élevé -1 | Ammi élevé 0 | Ammi élevé -3 | | |

Année 4 - Orge de printemps

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-------------------------|-----------------------------------|---|------------------------|-------------------------|
| Fév-d2 | Association de cultures : Fort | Aoû-d2 50% Aoû-d1 50% | Pas de labour | 200 gr/m² |
| Chénopode hybride 46 | Chénopode hybride -10 | Chénopode hybride -2 | Chénopode hybride 0 | Chénopode hybride 0 |
| Matricaire 42 | Matricaire -10 | Matricaire -4 | Matricaire 0 | Matricaire 0 |
| Carotte sauvage 21 | Carotte sauvage -10 | Carotte sauvage -3 | Carotte sauvage 0 | Carotte sauvage 0 |
| Séneçon vulgaire 21 | Séneçon vulgaire -10 | Séneçon vulgaire -3 | Séneçon vulgaire 0 | Séneçon vulgaire 0 |
| Ammi élevé 36 | Ammi élevé -10 | Ammi élevé -2 | Ammi élevé 0 | Ammi élevé 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 15 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | Chénopode hybride 34 |
| Chénopode hybride -1 | Chénopode hybride 0 | Chénopode hybride 0 | | Matricaire 27 |
| Matricaire -1 | Matricaire 0 | Matricaire 0 | | Carotte sauvage 7 |
| Carotte sauvage -1 | Carotte sauvage 0 | Carotte sauvage 0 | | Séneçon vulgaire 7 |
| Séneçon vulgaire -1 | Séneçon vulgaire 0 | Séneçon vulgaire 0 | | Ammi élevé 23 |
| Ammi élevé -1 | Ammi élevé 0 | Ammi élevé 0 | | |

Année 5 - Autre culture de print.

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-------------------------|--|---|-------------------------|-------------------------|
| Mar-d2 | Association de cultures : Très faible | Aoû-d1 50% Aoû-d2 50% | Nov-d3 | 12 gr/m² |
| Chénopode hybride 81 | Chénopode hybride 0 | Chénopode hybride -2 | Chénopode hybride -2 | Chénopode hybride 0 |
| Matricaire 48 | Matricaire 0 | Matricaire -3 | Matricaire -2 | Matricaire 0 |
| Carotte sauvage 41 | Carotte sauvage 0 | Carotte sauvage -2 | Carotte sauvage -2 | Carotte sauvage 0 |
| Séneçon vulgaire 40 | Séneçon vulgaire 0 | Séneçon vulgaire -2 | Séneçon vulgaire -4 | Séneçon vulgaire 0 |
| Ammi élevé 60 | Ammi élevé 0 | Ammi élevé -1 | Ammi élevé -1 | Ammi élevé 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Avr-d3 | Chénopode hybride 71 |
| Chénopode hybride 0 | Chénopode hybride 0 | Chénopode hybride -6 | | Matricaire 41 |
| Matricaire 0 | Matricaire 0 | Matricaire -3 | | Carotte sauvage 32 |
| Carotte sauvage 0 | Carotte sauvage 0 | Carotte sauvage -5 | | Séneçon vulgaire 30 |
| Séneçon vulgaire 0 | Séneçon vulgaire 0 | Séneçon vulgaire -4 | | Ammi élevé 54 |
| Ammi élevé 0 | Ammi élevé 0 | Ammi élevé -3 | | |