

Exploitation : SCEA croix de bois  
Parcelle : la montinette1  
Type de sol : sable

Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ammi élevé	84	
Chénopode	70	

### Situation initiale :

#### Année 1 - Pois de printemps

<b>Date de semis</b> Mar-d1 Ammi élevé 55 Chénopode 58	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Très faible Ammi élevé 0 Chénopode 0	<b>Interculture</b> Ammi élevé 0 Chénopode 0	<b>Date de labour</b> Nov-d3 Ammi élevé -1 Chénopode -2	<b>Densité de semis</b> 12 gr/m² Ammi élevé 0 Chénopode 0
<b>Entre rangs</b> 42 cm Ammi élevé 0 Chénopode 0	<b>Variété</b> Non couvrante Ammi élevé 0 Chénopode 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ammi élevé 0 Chénopode 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Ammi élevé 53 Chénopode 56

#### Année 2 - Haricot

<b>Date de semis</b> Jun-d3 Ammi élevé 18 Chénopode 36	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Très faible Ammi élevé 0 Chénopode 0	<b>Interculture</b> Ammi élevé 0 Chénopode 0	<b>Date de labour</b> Jun-d3 Ammi élevé -1 Chénopode -3	<b>Densité de semis</b> 12 gr/m² Ammi élevé 0 Chénopode 0
<b>Entre rangs</b> 42 cm Ammi élevé 0 Chénopode 0	<b>Variété</b> Non couvrante Ammi élevé 0 Chénopode 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ammi élevé 0 Chénopode 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Ammi élevé 17 Chénopode 33

### Année 3 - Pomme de terre

<b>Date de semis</b> <div>Mar-d3</div> <div>Ammi élevé 60</div> <div>Chénopode 66</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Très faible <div>Ammi élevé 0</div> <div>Chénopode 0</div>	<b>Interculture</b> <div>Sep-d3 50%</div> <div>Ammi élevé -1</div> <div>Chénopode -1</div>	<b>Date de labour</b> <div>Nov-d2</div> <div>Ammi élevé -2</div> <div>Chénopode -2</div>	<b>Densité de semis</b> 12 gr/m² <div>Ammi élevé 0</div> <div>Chénopode 0</div>
<b>Entre rangs</b> 42 cm <div>Ammi élevé 0</div> <div>Chénopode 0</div>	<b>Variété</b> Non couvrante <div>Ammi élevé 0</div> <div>Chénopode 0</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Ammi élevé 0</div> <div>Chénopode 0</div>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> <div>Ammi élevé 58</div> <div>Chénopode 63</div>

### Année 4 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> <div>Oct-d3</div> <div>Ammi élevé 39</div> <div>Chénopode 8</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Faible <div>Ammi élevé -4</div> <div>Chénopode -4</div>	<b>Interculture</b> <div>Sep-d2 50%</div> <div>Ammi élevé -1</div> <div>Chénopode -2</div>	<b>Date de labour</b> <div>Pas de labour</div> <div>Ammi élevé 0</div> <div>Chénopode 0</div>	<b>Densité de semis</b> 230 gr/m² <div>Ammi élevé 0</div> <div>Chénopode 0</div>
<b>Entre rangs</b> 15 cm <div>Ammi élevé -1</div> <div>Chénopode -1</div>	<b>Variété</b> Non couvrante <div>Ammi élevé 0</div> <div>Chénopode 0</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : <div>Fév-d3</div> <div>Mar-d1</div> Herse étrille : <div>Ammi élevé -3</div> <div>Chénopode -3</div>	<b>Désherbage chimique</b> <div>Mar-d2</div>	<b>Score annuel</b> <div>Ammi élevé 30</div> <div>Chénopode 0</div>

### Année 5 - Orge de printemps

<b>Date de semis</b> <div>Fév-d3</div> <div>Ammi élevé 45</div> <div>Chénopode 49</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Fort <div>Ammi élevé -10</div> <div>Chénopode -10</div>	<b>Interculture</b> <div>Aoû-d3 50%</div> <div>Aoû-d1 50%</div> <div>Ammi élevé -1</div> <div>Chénopode -3</div>	<b>Date de labour</b> <div>Nov-d3</div> <div>Ammi élevé -1</div> <div>Chénopode -2</div>	<b>Densité de semis</b> 220 gr/m² <div>Ammi élevé 0</div> <div>Chénopode 0</div>
<b>Entre rangs</b> 15 cm <div>Ammi élevé -1</div> <div>Chénopode -1</div>	<b>Variété</b> Non couvrante <div>Ammi élevé 0</div> <div>Chénopode 0</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : <div>Avr-d1</div> Herse étrille : <div>Ammi élevé -3</div> <div>Chénopode -3</div>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> <div>Ammi élevé 28</div> <div>Chénopode 29</div>

Année 6 - Autre culture de print.

<div>Date de semis</div> <div>Mar-d2</div> <div>Ammi élevé60</div> <div>Chénopode64</div>	<div>Étouffement culture</div> <div>Association de cultures : Très faible</div> <div>Ammi élevé0</div> <div>Chénopode0</div>	<div>Interculture</div> <div>Août-d1 50%Août-d2 50%</div> <div>Ammi élevé-1</div> <div>Chénopode-3</div>	<div>Date de labour</div> <div>Nov-d3</div> <div>Ammi élevé-1</div> <div>Chénopode-2</div>	<div>Densité de semis</div> <div>12 gr/m²</div> <div>Ammi élevé0</div> <div>Chénopode0</div>
<div>Entre rangs</div> <div>42 cm</div> <div>Ammi élevé0</div> <div>Chénopode0</div>	<div>Variété</div> <div>Non couvrante</div> <div>Ammi élevé0</div> <div>Chénopode0</div>	<div>Désherbage mécanique</div> <div>Bineuse : Mai-d2Jun-d1</div> <div>Houe rotative : Herse étrille :</div> <div>Ammi élevé-3</div> <div>Chénopode-5</div>	<div>Désherbage chimique</div>	<div>Score annuel</div> <div>Ammi élevé54</div> <div>Chénopode54</div>