

**Exploitation :**
**Roux**
**Parcelle :**
**Système Culture Initial**
**Type de sol :**
**Argilocalcaire**
**Commentaires :**

**Adventices étudiées :**

Adventices :	Risque :
Folle-avoine	5
Mouron	29
Véronique de perse	36
Chénopode hybride	21
Chénopode	21

**Situation initiale :**
**Année 1 - Luzerne**

<b>Date de semis</b>  <span>Sep-d1</span>	<b>Étouffement culture</b>  Association de cultures : Très faible	<b>Interculture</b>  <span>Aoû-d2 50% Aoû-d3 50%</span>	<b>Date de labour</b>  <span>Non définie</span>	<b>Densité de semis</b>  12 gr/m <sup>2</sup>
Folle-avoine 32 Mouron 5 Véronique de perse 42 Chénopode hybride 0 Chénopode 27	Folle-avoine 0 Mouron 0 Véronique de perse 0 Chénopode hybride 0 Chénopode 0	Folle-avoine -1 Mouron -2 Véronique de perse -3 Chénopode hybride -1 Chénopode -3	Folle-avoine 0 Mouron 0 Véronique de perse 0 Chénopode hybride 0 Chénopode 0	Folle-avoine 0 Mouron 0 Véronique de perse 0 Chénopode hybride 0 Chénopode 0
<b>Entre rangs</b>  42 cm	<b>Variété</b>  Non couvrante	<b>Désherbage mécanique</b>  Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b>
Folle-avoine 0 Mouron 0 Véronique de perse 0 Chénopode hybride 0 Chénopode 0	Folle-avoine 0 Mouron 0 Véronique de perse 0 Chénopode hybride 0 Chénopode 0	Folle-avoine 0 Mouron 0 Véronique de perse 0 Chénopode hybride 0 Chénopode 0		Folle-avoine 31 Mouron 3 Véronique de perse 39 Chénopode hybride 0 Chénopode 23


## Année 2 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Non définie</b>	<b>Association de cultures :</b> Très faible	<b>Folle-avoine</b> 0 <b>Mouron</b> 0 <b>Véronique de perse</b> 0 <b>Chénopode hybride</b> 0 <b>Chénopode</b> 0	<b>Folle-avoine</b> 0 <b>Mouron</b> 0 <b>Véronique de perse</b> 0 <b>Chénopode hybride</b> 0 <b>Chénopode</b> 0	<b>Folle-avoine</b> 0 <b>Mouron</b> 0 <b>Véronique de perse</b> 0 <b>Chénopode hybride</b> 0 <b>Chénopode</b> 0
<b>Entre rangs</b>	<b>Variété</b>	<b>Désherbage mécanique</b>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b>
42 cm	<b>Non couvrante</b>  <b>Folle-avoine</b> 0 <b>Mouron</b> 0 <b>Véronique de perse</b> 0 <b>Chénopode hybride</b> 0 <b>Chénopode</b> 0	<b>Bineuse :</b> <b>Houe rotative :</b> <b>Herse étrille :</b>  <b>Folle-avoine</b> 0 <b>Mouron</b> 0 <b>Véronique de perse</b> 0 <b>Chénopode hybride</b> 0 <b>Chénopode</b> 0		<b>Folle-avoine</b> 0 <b>Mouron</b> 0 <b>Véronique de perse</b> 0 <b>Chénopode hybride</b> 0 <b>Chénopode</b> 0


## Année 3 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Non définie</b>	<b>Association de cultures :</b> Très faible	<b>Folle-avoine</b> 0 <b>Mouron</b> 0 <b>Véronique de perse</b> 0 <b>Chénopode hybride</b> 0 <b>Chénopode</b> 0	<b>Folle-avoine</b> 0 <b>Mouron</b> 0 <b>Véronique de perse</b> 0 <b>Chénopode hybride</b> 0 <b>Chénopode</b> 0	<b>Folle-avoine</b> 0 <b>Mouron</b> 0 <b>Véronique de perse</b> 0 <b>Chénopode hybride</b> 0 <b>Chénopode</b> 0
<b>Entre rangs</b>	<b>Variété</b>	<b>Désherbage mécanique</b>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b>
42 cm	<b>Non couvrante</b>  <b>Folle-avoine</b> 0 <b>Mouron</b> 0 <b>Véronique de perse</b> 0 <b>Chénopode hybride</b> 0 <b>Chénopode</b> 0	<b>Bineuse :</b> <b>Houe rotative :</b> <b>Herse étrille :</b>  <b>Folle-avoine</b> 0 <b>Mouron</b> 0 <b>Véronique de perse</b> 0 <b>Chénopode hybride</b> 0 <b>Chénopode</b> 0		<b>Folle-avoine</b> 0 <b>Mouron</b> 0 <b>Véronique de perse</b> 0 <b>Chénopode hybride</b> 0 <b>Chénopode</b> 0

## Année 4 - Luzerne



## Année 5 - Autre culture d'hiver



## Année 6 - Autre culture de print.



## Année 7 - Blé d'hiver

